LEONARDI PLUKENETŸ.

PHYTOGRAPHIA.

Sive

Stirpium Illustriorum, & minùs cognitarum

ICONES,

TABULIS ÆNEIS.

Summâ diligentiâ elaboratæ;

Quarum unaquæq; Titulis descriptorijs ex Notis Suis propriis, & Characteristicis desumptis, insignita; ab alijs ejusdem Sortis facile discriminatur.

PARS PRIOR.

MEMINISSE JUVABIT.

J. Collins fec.

Εμπειρον ειναι συμβαλλω πασον τι διοντε πάντων φυτων. Gal. de Antidot. lib. 1. cap. 15.

LONDINI. MDCXCI.
SUMPTIBUS AUTORIS.

1691

HONORATISSIMO

et.

ÆTERNVM REVERENDO

PRÆSULI ac DOMINO.

DOMINO

HENRICO COMPTON

LONDINENSI EPISCOPO. &c. &c. &c.

Omnium Botanophilorum MECÆNATI summè colendo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

Has suas TABULAS PHYTOGRAPHICAS in priori Parte comprehensas.

Quòd

HUIUS FAVORE ut plurimùm Illustrantur, submissâ cum observantiâ, in devoti animi tesseram, gratæq; mentis symbolum, VOTIVAS reddit, jure meritoq.

Offert Dicat. Consecrat.

LECTORI BENEVOLO.

Natura parens sui studiosa conservatrix, artis & pulchritudinis suæ sibi conscia perditura fructum sui, si amplum hunc terrarum Orbem solitudini ostenderet, ut desiderium contemplandi fertilissimum stirpium apparatum, quem in ipsâ superficie subministrat nobilissima hæc quam pedibus calcamus Terra, in nobis excitaret, & conservaret Novitate animos nostros ad se alliciat, dum indies è coris Asiæ Provinciis, & à Primoribus prorsùs incognitas in apricum producit plantas: Quamplurimi etiam Europæ loci à Majoribus nostris non rité examinati Novas formas, Novas species, quotidie nobis suppeditant Africa quòq; his nostris temporibus, monstra sua gignere non desijt: sed Novi aliquid ex Plantarum genere, semper ab extremis parturientis Africæ oris, ad nos adportatur. Nec hîc Natura subsistit, sed continuè Novas ex alieno Orbe, in lucem profert plantas. Novæq; virtutes à stirpe Artis, in salutem humani generis inveniuntur: Vigilant enim Sæculi nostri Botanici, qui (ut Cl. Raij verbis utar) nec Majorum inventis contenti, ad ulteriora tendunt, nec alios sibi inquisitionum terminos, & columnas figunt, quam quas Natura terris fixit, Universum Orbem curis suis complexi. Illi stilicet stimulo nihil fuere ut nulli sudori, operæ, ac sumptui parcerem, quin tam indigenas, quàm exoticas stirpes inquirerem, atq; colligerem, quarum investigatio ab ipsâ Adolescentiâ, nobis amœnissimâ varietate se commendarit; fateor equidem Botanica in omni ævo, melioris luti Quamplurimis excelli; et in Artemedendi vel antiquissima est ratio, per simplices Herbas, morbos abigendi; Hujus enim Cognitionem ad Principes, etiam & Magnates pertinere Salomonis (regum omnium quos Sol unquam aspexit Sapientissimi) Alexandri magni, Mithridatis, Diocletiani, & aliorum docuere exempla; Imperatores & Reges non pauci Heroesq; Inclyti, Indagationem & peritiam hujus Naturalis Philosophiæ partis se dignissimam judicarunt, rati se Herbariæ rei colendo studium optimè de humano genere mereri. nec minus solidam, veramq; laudem indè, quàm ex Triumphis, ad omnem Posteritatem, nomini suo libare posse; Hanc tanti fecerunt Ethnici ut quis Inventionem, Diis dignam æstimarint, & licet dubitare videantur, de primo eorum Inventore, consentiunt, tamen tandem Apollinem illâ prærogativâ maximè præeminere, his Poetæ verbis.

Inventum Medicina meum est, Opiferq; per Orbem
Dicor, et Herbarum subjecta potentia Nobis.

et semper fuit adeo incredibilis apud Antiquos existimationis Herbarum Scientia, ut æqualis censebatur gloria, Herbam invenisse & Vitam juvasse. Quicquid enim hujus Sæculi sentiunt alij, nobis satis persuasum, Studium hoc Botanicum necessariam esse Physicæ & Medicinæ partem multis jucunditatis, & Delectationum condimentis gratiosam, & toti generi humano, utilitate quam maximè commendabilem: Visum igitur fuit, ut Nobilissimæ Botanices Scientiæ, ulterius inserviam, Plantarum aliquot Icones non alibi ex præsciæ peritiorgâ manu, et emendatâ ad Plantarum ipsarum dimensiones naturales proportione quàdam, effigiare, & adumbrare. et earum plures, compendij gratiâ in unam Tabellam conjeci; Opus non minùs varium, quàm ipsa est Natura, ubi Orientis & Occidentis Indiæ Montium, Sylvarum, Vallium, litorum & camporũ, Stirpes nativæ, & alumnæ à nullo Classico Autore antèa celebratæ, sed prorsùs Novæ, & hactenus inauditæ, oculis vestris obversantur; singulis etiam hujusmodi Novis plantis nomenclaturam, propriis & genuinis Symbolis insignitam accommodavimus. ut quæ rem ipsam aptissimè notat, & clarior foret omnis earum Cognitio simul & Cognatio, quam insuper dissimilitudinis collationis & similitudinis ope inter Congeneres, & similimas, iteratæ inspectioni, & ex Plantis ipsis expansioni, adaptavimus. Nam hæc omnia ex αὐτοψία didicerimus, non ut Nicander Colophonius, qui ab agro remotissimus, rustica aggredi, non veritus; neq; ut Pamphilus, quem Galenus reprehendit, quòd cum non conspexerit; nè dum per Somnium viderit, de his tamen scripserit: Has nobis vidisse contigit omnes, & etiamnum præ manibus sunt, quas in Herbario nostro vivo, impræsentiarum conspicere licet, aliasq; permultas, & inditas habeo, quas tamen in præsenti non exhibeo, quia Chartæ penuria, & typorum immodica deterrent impensa, neq; enim potest quis ullam certam cognitionem sibi arrogare Vegetabilium quæ nunquàm aspexit. Benevolus interim Lector has Tabulas Phytographicas, æquo suscipiat animo, donec Herbarij vivi Catalogus, Plantarum circiter Octo millium comprehendens consequatur, nec dubito quin candidi Rei Herbariæ cultores, non solùm admiraturi sint, sed grati recolent quòd tot incognitas (octingenti ferè numerantur) in his Tabulis nostris duas in partes distributis, luci nunc damus, & si quid, vel etiam Viris eruditioribus, unquam Novitate suâ, se commendarit; Tabulæ nostræ Phytographicæ, Novi Orbis, Novis (ie) novissimè detectis, & hucusq, ineditis stirpibus, sunt refertissimæ, quibus amplum Exscriptoribus campum damus, in quo plantas legere possunt, easq, generali Plantarum Indiæ, seu Pinaci inserere, quæ in nostro Orbe jamdudùm innotuerunt; ex quibus omnibus non desperarem, nos Botanophilis perplacuisse, & plurimas ab ijs gratias promeruisse, tùm ob ea quæ jàm præstitimus in hoc opere nunc edito, tùm ob ea, quæ præstituri sumus in Catalogo nostro, brevi edendo, ut hac ratione, vobis meis amplissimè satisfactum iri arbitrarer. Utaris ergò Lector amice his nostris laboribus, quos amœno huic operi impendimus, ac stirpes hasce peregrinas rarissimas, & hactenus inauditas, quæ nunc ex actis Imaginibus Orbi panduntur, adspicias, & in omnibus inexhaustam Sapientiæ profunditatem, & Majestatem divinam in ipsis Condendis, comperies; His nobiscum ad Dei gloriam, tuamq; ac cæterorum utilitatem, & oblectamentum paratis. fruere pro otio, & incolumnis age; Vale.

INCLYTO HEROI

atq.

ILLUSTRISSIMO DOMINO.

DOMINO

à BENTINGK.

COMITI de PORTLANDIA. &c. &c. &c.

φιλοβοτανῶν PATRONO longè Gratiosissimo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

Hortorum amœnitates, ac adumbratam VEGETANTIS ORBIS Imaginem, Hisce TABULIS suis PHYTOGRAPHICIS in altera Parte contentis exhibitam, summâ cum humilitate.

Dat. Dicat. Dedicat.

APPENDIX

ad Rariorum Plantarum Icones

LEONARDI PLUKENETII.

☞ Propter Literarij Sculptoris incuriam, aut saltem nostram in hoc opere properantiam contigit, Iconem Tab. 82. Fig. 5. adscriptam, absq; titulo exhiberi; hujus ergò Synonyma hic subnectere lubet, ut suo loco reponantur. Viz.

5. Cerasa Hottentottorum: Lycium Africanum fructu Cerasi rubro. Parad. Batav. Prodr. 349. Rhamnus Africana Cerasi fructu ejusd. P. B. P. 369

ALTERA

APPENDIX

ad Rariorum Plantarum Icones Quá

Stirpes quasdam exoticas proponere nos placuit, quarum Exemplaria ex India Orientali humanissimus Vir, ac Chirurgus peritissimus D. Richard, Sambach misit amico suo D. Iacobo Pettever Pharmacopæo, & apud Londinates Botanico meritissimo: à quo demum ad delineandas æreisq; typis exprimendas accepimus: Istis itaq; duobis cordatis viris grates agere de his debent qui studium Botanicum colunt

Collins sculp.
LEONARDI PLUKENETT. D.M.
EFFIGIES Ætat: suæ 48 Año Dom: 1690

Tab. I. 1. *Abies Pinum referens foliis ex omni parte prorumpentib. Abies foliis prælong. Pinum simulans.* Ray. Hist. an Picea minor C B P.^t Pinus maritima minor ejusd Cat. H. Ac. Lugd.^t

2 *Absinth. minus odoratū Gangeticum, floribus Chamæmeli solitarys, e foliorum alis.*

3 *Absinth. tenuifol. elegans ex Hispania; D.^ris* Turnefortij.

4. *Acacia ō Spinosa* Wagæ. Malabar. *Similis è* Maderaspatan. *lit. a fol. ad justā magnitudinem denotat.*

5. *Acaciæ similis ō Spinosa ramulis alternis* Maderaspatana. *an Nili camarām. H.M.^t pro hujus Synonymo Canna Indica arborea Zanon. ponitur à* Breyn. Prod. 1. *cum Nellikam ejusd huic magis convenire Videatur.*

6 *Acaciæ quodammodo accedens. s. Ceratiæ & Acaciæ media Iamaicensis spinosa bigeminatis foliis, floscvlis stamin. atronitente fructu, siliquis parum intortis. lit. a flosculos. b. Siliquā et fructum indigitant. Unguis Cati Arbor Americana spinosa siliquosa* Par. Batav. Prodr.

TAB. II.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.



Fig. 4.

Tab. II.

1. *Acacia Mederaspat. spinosa* Inſiæ accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. a. folium ad natural. dimensionē exprimit.

2. *Acacia gloriosa Leutisci fol: spinos. flore spicato luteo. siliquâ magnâ muricatâ. Arbor exot. Spinos. fol. Lentisci C.B.P. Inimboy Bras. Marcgr. Bonduch Zanon. Carelli* H.M. lit. a. folium ad veram magnitud. cum aculeo sursùm spectante. lit. b. lobum spinis crebrioribus; armatū indicat.

3. *Acacia* ō *spinosa minor* è Quaracoa ſ. *Curaſsavica fl. alb. globoso. fortè Tehoaxin Mexicens. Hernand.*

4. *Acer Virginianum folio majore subtùs argenteo, supra viridi splendente. Acer florese. Virginiana Vulgō. Arborē hanc magnitudine & proceritate eximiam* in Hort. D. Ioh. Tradescanti *Lambethæ ad Austrū jam olim enutritam sæpe conspeximus; sed eam ibi unquam floruiſse a nemine memoratum audiimus.*

TAB . III .



Tab. III

1) Acer Bonohalense Laurin foly.s fructu terqemino. totidem membranulis extantib; alato.

2 Adianth. alb. floridi 1. Filicula petræa crispa Ray Hist. Adianth. album crispū Alpinū Schwenckfeld. I.B.

3 Adianth folys minutim in oblongum scissis. pediculo viridi. C.B.P. Ad. alb. tenuif. Rutæ murariæ accedens I.B.

4 Adionth. album florid. Cicutariæ folio Virginianū nostrum. D. Ray Hist. app.

5. Adiant. radicos. humisparsū. 1. Filicula pellucid. nostras Coriandri foliolis mollicellis globuliferum Adiant. petraum perpusillum. Anglicū folys bifid. vel trifid. Newtoni Ray. Hist. forte Filicula saxatilis fol. Coriandri. Mentz. pugil.

6. Adianth. radicos. erectius foliolis imis bisectis, cæteris verò in-tegris tenuissimè crenatis. forte Filicula saxatil. Coriandri folys rotund. leviter serratis Mentzel. pugil. Rarior. Pl.



Tab IV

1. *Adianth. nigrum Chinens. tenuiter divisum, pinnulis minimis, obtusis, plerumq; bifidis.* Ray. Hist. app. an *Filix saxatilis crispa* Park? *Ic. a. ramulum ad justam magnitudinem denotat.*

2. *Adianth. minus* 5. *Dryopteris Chinensis lanuginosa* Ray. Hist. app. an *Lonchitis Maranthæ folerach ramosum Quorund* Lob. Ic. 5. *Polypodium Huons* Hist. Lugd. *quæ secundùm utrosq; Bauhinas sunt unus & idem.*

3. *Adianth. Chinense pereleganis ramos folio flabelliformi cum rubedine perfuso. Adianthum folijs Coriandri ramosum* Ray. Hist. app. *has tres Adianthorum species habuit Cl. Rajus ab. egregio Botanico & Pharmacopæo Londinensi Dno Iacobo Petiver qui postea ad icones exculpendas, nobis libenter concessit.*

4. *Aschynomene mihi* 5. *Mimosa* De Tunquin *pinnulis amplioribus Chamæfilici marinæ æmulis. Sub* Ovali *titulo recepimus, foliorum formâ Tsjampanoam* H. M. *haud multùm abludit.*

TAB. V.



Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Tab V

1. Æsch. mitis Americ. foliolis Acaciæ brevioribus; Br. Cent. Mimosa Americ. supina Veluti spinulis exasperata, pinnis Acaciæ latioribus; & brevioribus ejusd. Prodr. 2.

2. Æschyn. mitis 1. Mimosa angustiori siliquâ foliis perexiguis Maderas-patnna Æsch. foliis minimis nostra. Ray. Hist. app.

3. Alcea Indica frutesc. foliis ad marginem exasperatis Bryoniæ albæ divisuris. è Sinu Bengalens. allata est nobis.

4. Alcea spinos. Maderaspatnna fol. profundè lacinatis, Cannabis in modum penta-phyllea. saporis acidi an Acetosa Indica Bonti. Hujus meminit Cl. vir & sedulus exoticar. Pl. explorator Dr. Herman in Cat. HAc. Lugd. pag. 27.

TAB. VI.



Tab. VI.

1. Alcea Cretica flore immaculati candoris peramplo. in Hort. Medic. D. Morgan Londini Subur bano, jam olim exculta fuit.
2. Alcea acetosa Indica mitis foliis superioribus Gossipij in modum tripartito divisis Althæa Indica Gossipij folio Acetosæ sapore CHAL.
3. Alcea Indica Ulmi folio prægrandis subtus incana flore amplo purpureo. Althæ magna 5gy. capsularis foliis integris subtus albicantibus, floribus magn. Banist. Cat. Virgin. apud. Ray Histor. inferiora enim hujus folia sunt prorsus integra, superiora tamen in lacinias ternas leviter incisa, & inversâ parte albicantia.
4. Altea 5. Bamia American. parvo flore, petalis rotundioribus.
5. Anchusa lutea minor C. B. P. I. B. Park. item Symphytum angusti fol. Apulum ejusd. Park. Anchus. echioid. lutea Corinthes flore, montana. Col. ecphr.

TAB. VII.

Tab. VII.

f. 1. Alcea Ind. fol. hastato, fl parvo, purpur. longo petiolo insidente, pericarp. compacto, duro in 5 ℘. cellulas, totidem semina includentes dispertito. Pr.

2. Althæa frutesc. Ind. Orient. Populi albæ minoris fol. tenuiter dentato molli. an Althæa Americ. frutesc. Populi albi foliis Par. Bat.

3. Alsine Caryophylloid. tenui fol. fl. albo punctato. an Ms. Coryophylloid. tenuifol. montana Lini flore Ray Hist. forte etiam Polygonum Caryophylli Holostei flore Cat. H.R. Bles. Betonica. s. Tunicæ minimæ similis Planta I. B.

4. Alsin palustr. Ericæ folia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. Saxifraga palustr. Anglica Goodyeri Park. item Alsin. nodosa Germanic. ejusd. Park. Alsine nodosa Germanic. alias Arenaria. C.B.P. Arenaria I. B.

5. Alsine formis paludosa tricarpos flosculis albis inapertis. Alsine palustris Portulacæ aquatic. similis. Ray. Hist. Alsin. palustr. minima flosculis albis, fructu Coriandri exiguo Mentz. pugil. Portulaca exigua. s. arvensis Camerarij I.B.

6. Alsin. spuria pusilla repens foliis Saxifragæ aureæ Ray. Cat. Pl. Angl. Hujus notitiam Doctiss. nostro Rnio debemus, proinde muratus sum quo casu in Caleberrim. Autoris Histor. Universal. hæc plantula omissa fuit.

TAB. VIII.



Tab. VIII.

fig. 1. *Althæa frutesc. folio acuto virente molli, flore speciosо. an Althæa frutesc. folio acuto flore magno* Schol. Botan. *Althæa profundè serrato. 5. dentato folio* I. B. *Althæa flore majore* C. B. P. *et fortasse eadem cum Althæa arborea Olbiæ Provincialis Advers. Lob. & Icon. Malva syloestr. perennis folio profundè laciniato & dentato* Moris. Hist.

2. *Althæa frutesc. Bryoniæ folio incana flore minore Althææ species quibusdam arborea altera, vel Bryoniæ folio* I. B. *Alth. semperirens Bryoniæ fol.* Park. *Alth. frutesc. Bryoniæ folio; item Alth. frutesc. folio acuto parvo flore* C. B. P. *Malva frutesc. folio acuto auriculato Hederæ instar Moris. Hist. Althæa Olbiæ bulgo putata.*

3. *Althæa fruticans Hispanis Aceris Monspessulan. incanis foliis grandiflora saponis odore. Alth. frutesc. folio rotundiore incano* C. B. P. *Alth. arboresc.* I. B. *Alcea frutesc. folio rotundiore incano* Moris. Hist. *item Malva Hispan. foliis mollib; undulatis in margine superiùs micis sulphureis adsolem lucentibus donatis ejusd* Moris. Hist. *quoad descriptionem; at in Tabul. huic Titulo alterius Icon substituitur, Althæa Provincialis Pœnæ Advers. ex sententia D. Rajj Hist. 603.*

TAB. IX.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

a.

b.

Tab. IX.

1. Alsines facie myosotis Bisnagarica frutescens flosculis pallidè flavescentibus cujus folia sunt ad caulem alterno positu, (non per intervalla geminata) incana, hirsuta; flosculi quidem ut Anagallidis, non tamen cærulei, alioquin habitu admodum diversi minis in caule stenimrevera à Convolvulis minimis species Bisnagarica.
2. Althæa Indica latiori folio cordiformi, ad summum sinuato. Malva Indica frutescens folio cordato P.B.P.
3. Althæa rostrata Cormandeliens. Pimpinellæ major. fol. subrotundo.
4. Althæa fruticosa minor Ganaetica folijs exiguis margine spinosis.
5. Althæa Ind. floscul. parvis folliculatim (fortè fasciculatim) ramulis adfixis. Breyn. Prodr. 1. Malva American Carpini folio, floribus aureis fasciculatis parvis P. B. P. è Maderaspatan nobis allata est.
6. Althæa Virginian. bidens Pimpinellæ maj. acutiore folio, flosculis minimis luteis. fortè Alcea Mori folio Virginian. min. Sch. Bot.



I. Collins. del: & fe.

Tab. X

1. Amaranth; albus Cinnamicus Salviæ angustis folys paniculâ conglomeratâ. an Amarant. Alopecuroid. Indicus frutesc. lanuginos; folys Salviæ angustioribus; & longioribus; Br. Prod. 2? Salvia Amaranthoides Mich. Nutij Fascic. Herbar.
2. Amarant. Ind. min. lanuginos. Sampsuchi folys, spicâ albâ ad foliorum exortum gemellâ. an Amarant. Alopec. Ind. frutesc. lanuginos; folys Salviæ latioribus; & brevioribus; Br. Prod. 2?
3. Amarant. verticillatè; min. Bengalens. Serpyll. folijs incanis.
4. Amarant. spicat; Dictamni Creticæ folio Maderaspatensis.
5. Ambrosia maxima inodora Marrubij aquatic. folys tenuiter laciniatis Virginiana.
6. Ambrosia (forsan) è China Anguriæ folys accedens. à D.no Poliver recepi.

TAB. XI.



1. Ammi majus exoticum folijs per ambitum elegantèr incisis. an Ammi alterum semine Apij C.B.P. Ammi odore Origani I.B. nostra folia à Dauco Cretico Zanon. haud multum abludunt.
2. Amomum Virgin. Evonymo Virgin. simile, floribus & fructu sparsim erumpentibus, Amomum Virginianum Corniferæ facie Ray Hist.
3. Amygdalus Indica nana. Cat. H.R. Paris. Amygdalus pumila Cat. H.R. Bles.
4. Amygdalo-persica nana flore carneo pleno Africana. Persica Malus Africana nana flore incarnato pleno Cat. H. Ac. Lugd. hujus ramulum a. floribus onustum denotat.

TAB. XII.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Tab. XII.

1. *Aegolum forte* H. M. *Arbor Indica baccifera fructu umbilicato, rotundo, Cerasi magnitudine, dicocco.* Ray Hist. *è semi Gattachio nobis adeogue*

2. *Amarum Africanum fruticescens foliis & caule rore cæruleo tinctis. Ferula fruticosa semperviren̄s foliis Anisi Galbanifera, ex quâ Galbanum officinarum* P.B.P.

3. *Anthyllis s. Alsine maritima honosior Anthylloides, foliis tomentosis Bisnagarica.*

4. *Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuissimis, sursùm inflexis, floribus sparsis, calyce spinulis asperato.*

TAB. XIII.



Tab XIII

f. 1. *Apocynum Canadense maximum flore minimo herbaceo* Cat. HR. Bles. *item Apocyn. Virgin. flore herbaceo, siliquâ longissimâ, & tenuissimâ* Morison. Prælud. Botan.

2. *Arbor Aristolochiæ folijs Maderaspatana fructu parvo Medicæ adinstar involuto. an Gummi Elemi fundens Arbor Orientalis?*

3. *Arbor baccifera Orientalis, folio rhomboide, fructu calyculato. Cassia Cinamomea s. Canella de mato.* Linschot. part. 4. Ind. Orient.

4. *Arbor è Cormandel vasculifera folijs amplis Myrsinites rigidioribus, nostra* Ray. Hist.

TAB. XIV.



Tab. XIV.

1. *Arbuscula Bengalensis, Aceris minore folio incano alternatim posito.*
2. *Arbuscula è Maderaspatân folijs Aceris alternâ vice lucidè virentibus.*
3. *Arbuscula Zeylanica Aceris folio baccifera, folijs è directo magis angulosis.*
4. *Arbuscula Bisnagarica Aceris folio parvo aculeata, folijs è regione binis.*
5. *Arbor aromatica è Cormandèl Laurinis folijs binis ternisve nostra D. Ray Hist.*
6. *Arbor Prunifera, sphærulas saponarias ferens tetraphylla, ex Ind. Orient. an Saponaria Arbor Zeylanic— trifolia semine Lupini: Conghas Zeylanensib; P. B P.*
7. *Aster Americanus frutescens Satureiæ folijs scabris floribus amplis, saturatè Violaceis.*

TAB. XV.



Tab. XV

1. *Artemisia Chinensis cujus molluco Moxa dicitur, fortè Ytzecumpatli Mexic.* Hernand. *an Artemisia Virginiana* Park?
2. *Aristolochia Violæ frutices folijs virginiana, cujus radix Serpentaria dicitur.*
3. *Asarum è Terrâ Mariana Violæ luteæ vel Asarinæ folijs, Serpentaria nigra Nostratib; dicta.*
4. *Asparagus aculeatus minor sarmentosus è Maderaspatan.*
5. *Asparagus (fortè) aculeatus major spinas plurimas ab eodem exortu pro foliis ferens. an Asparagus aculeatus Siculus Ray Hist.? an Spina umbellâ foliis vidua C. B. P. Drypis Theophrasti Anguillarce I. B.?*
6. *Aster exoticus Hyoseridis folio minore noster D. Ray Hist. app.*
7. *Aster African; Stœchadis inodoræ foliis incanis flore albicante. Aster Afric. Stœchad. folio noster* Ray H. app.
8. *Aster Bonaalensis omnium minimus, summo caule biflorus.*

TAB. XVI.



1. Aster luteus latifol. glaber foliis viridis, & minutissimè crenatis. an Aster luteus folio glabro & crenato CBP.[2] ubi Synonyma huic Plantæ à Casp. Bauhin. male sunt appropriata.
2. Aster peregrinus Cisti folio non crenato, flore magno luteo. an Aster odoratus flore luteo stellato exoticus Cat. Pat. à Tauro, fortè Aster Conyzoides luteus perennis Icon Roberti.
3. Aster luteus fœtidus Crithmi Chrysanthemi folio, floribus umbellatis. Iacobæa Crithmi litorei foliis Catal. H.R.Bl. Iacobæa fœtida Crithmi Chrysanth. facie Brunjeri. Cat. H. Iong. Iacob. Rosmar. fol. Quorund.
4. Atriplex maritima Mauritanica frutescens, Polygoni foliis argenteis racemosa. Atrip. marit. Mauritan. fol. Polygon. argent semine amplo fusco vasculis rotundioribus; nostra D. Ray Hist. append.



Tab XVII

1. *Bellis montana incana & crenata folijs & crenis obtusis. an Bellis montana folio obtuse crenato. C B Pin & in Prodr. Bellis sylvestris folio crasso & villoso. Sch. Bot.^ubi ponitur pro nondum descripto.*
2. *Bellis Americana procerior serotina ramosa flore amplissimo Cat. H. Ac. Lugd. an Bellis radice repente. foliis latioribus, serratis. Cat. H. R. Bles. forte Tlally-yetl. Noo. Hispan. Hernand.? Bellis indica maxima C. H. Ac. Pat. Turn.*
3. *Bellis montana folys Coronopi lacinijs s. denticulis rarioribus & magis extantibus an Bellis Alpina folys profunde dissectis Sch. Bot.? Bellis leucanthemia (s. Anthemis) frutescens folys profunde laciniatis Breyn. Prodr. 2. Bellis montana folys Chrysanthemi D.^ris Magnol emisd Breyn. ibid. Bellis chrysanthemi segetu folio D.^ris Hons Sloan. Ray Hist.*
4. *Bellis pumila crenata Agerati æmula, crenis bicornibus asperiusculis. Bellis maritima folijs Agerati C B P & in Pr.*
5. *Bellis montana Tanaceti folijs caule singulari annua. Chamæmelo affine Buphthalmum Italicum segetum altissimum I B.*
6. *Bellis Alpina Parthenij folijs elatior.*

TAB XVIII



1. Lilii Martagon ... Adiantopatuma flore peculiari.
2. Altum Africanum Calthae palustris folio caule nudo cubitali spicam pedalem Camphuis ... Petasites Africanus Calthae palustris folio ... H. Ac. Lugd. Petasitidis folio Bliti fructu D. Ray Hist. append.
3. Bunula caerulea Alpina Park. Consolida media caerulea Alpina C.B.P. & I.B. item Consolida media Genevensis ejusd. I.B. Histor. Universal.

TAB XIX.



... acaulis ... D. Ray Hist. appen. ... Hispanica Andelusica Cubi Hispanici collect. Hanc elegantem Cynaram Cardui speciem multebat adhuc Ornatissimus Vir & nobis amicissimus D. Joh. Fishwick.

TAB.XX.



Vid. Ad. Christophoriana arbor aculeata Virginiana. Angelica arborescens spinosa. Arbor inermis trifolium folijs cortice spinoso Ray Hist. Arbor spinosa trifolium folijs Virginiana D. Edward Morgan. Angelica arbor vulgò lit.

a. folium hujus naturali magnitudine depictum. b. seminum Umbellas indicans



Tab. XXI.

1. Chrysanthemum Americanū Doronici fol. fl. Persici coloris, umbone magno prominente, ex atro-purpureo, luteo, & aureo, fulgente, an Bellis Canadensis purpurea Clasii Fascic. Herbar. Mich. Mutt. p. 22.
2. Chrysanthem. Canadens. latifol. humilius. Moris. Præludi. Bot. Chrysanth. Canadens. humilius. Bocconi de Pl. Sicul. Asteri pyrenaeus luteus, alter minor. Park.
3. Chrysanth. African. Asteris facie, uno flore non foliose, capitulis duris.
4. Chrysanth. Bengalense augusti-folium pusillum, summo caule ramosum.
5. Chrysanth. segetum nostras folio glauco multisecto maj. fl. minore.
6. Chrysanth. tenuifol. flore luteo subtus purpurascente. Buphthalmu. tennifolium folio Millefolij fere C B. Buphth. caule & folio purpurascente C B? Buphth. flore purpurasc. Park.
7. Chrysanth. Smyrnæum Cotulæ folio, flore amplo nudo seminibus hispidis, ad capitula in orbium spiras circumvolutis. an Chrysanth. balenticum, Clus (ic) Buphthalmum lanuginosum foliis Millefolij C B? Elegans hæc planta cujus folia aliquando lanugine obducta invenimus ex semine in Cabis & corbulis quibus Ficus & Uvæ passæ è Smyrna ad nos transportantur, disperso & inde collecto, enata, Angliæ primò & nostræ demum notitiæ accessit.



Tab XXII

1 Chrysanth. Scrophulariæ folijs Americanum.

2 Chrysanth. Cannabinum Virginian. hirsutum, disco nigro, petalis aureis radiato. Chrysanth. s. Flos solis laciniatus annuj umbone nigri cante D. Bobart. in Eupatorium Cannabinum Americanum flore aureo Cat. Hort. Reg. Bles. lit. a a. summum ramulum suis floribus ornatum denotant.

3 Chrysanthemum Peruvianum flore albo Cat. Hort. Lips. olim. edit.

4 Chrysantha Chinense folijs pluriſariam divisis. Halicacabi pericrini æmulus; Chrys. fol. multifidis. Cicutæ nonnihil similibus Bromianum Cat. Hac. Lugd. Chrys. Cannabinum Americ. fruticos. Dibromianum Sambuci laciniatis folijs facie Breyn. Prodr. 2. è China ad D. Pelivet allata est hæc elegans planta, & ab illo nobis amicissimè communicata.



Tab XXIII

f. 1. Campanula Cymbalariæ folio Park. Camp. Cymbalar. folio vel folio hederaceo C B P. Campanul. folio hederæ; species Cantabricâ Anguillaræ I B.

2. Cicer Astragaloides (forte) Virginianum, hirsutie pubescens florib. amplis, subrubentibus. an Cicer montan. lanuginos. erectum C B P. D Bonister Cat. Shrp. Virgin.

3. Cistus Americ. an. Chamæcerij foliis lucentibus ex Hort. D Morodin an Tzatzoqua Mexicens. Hernandez.

4. Cistus Chamærhododendros foliis confertis, ferrugineis rubicine nitentibus, margine pilosis.

5. Cistus Helianthemos argenteus folio latiore, flore saturate luteo. Helianthem. Alpin. folio. Pilosellæ minoris Fuchsij I B. ex sententiâ D. Rd et forte Cistus helianth. folio Polij montan. ejusd. item Cistus pusillus folio candido, flore luteo, ejusd I B. ex monte ipsius Ray. Hist.

6. Cistus humilis Alpinus durior. Polij nostratis folio canescente. Chamæcistus montana, Polij folio noster D. Ray. Synops Stirp. Brit. an Chamæcist. foliis Myrti Tarentin. cæsis & cinereis I B.

7. Cisti Helianthemi foliis planta Maderaspatana, floribus ex alis. an Vitis Idæa Cisti helianthemi foliis Maderaspatana.



Tab XXIV.

f 1 *Clinopodium Virginianum angustifoliũ. fl. amplis luteis, punctis purpureis. Clinopod. Virgin. angustif. flore luteo* Cat. Hort. Ac. Lugd. *Origanum floribus amplis luteis purpuro-maculatis, cujus caulis sub quovis verticillo decem vel duodecem foliolis rubentibus est circumcinctus. D. Banist.* Cat. *Shrp. Virgin.*

2 *Conferva reticulata crispa. D. Doody* Ray Hist. app.

3 *Convolvulus angustissimo folio nostras cum auriculis. an Convolo. arvensis minim; D. Dent* Ray. Synops. *shrp. Brit.*

4 *Convolvulus maritim. s. Soldanella è Maderaspatan; folio in summitate sinuato. an Convolo. marit. Zeylanic; folio crasso cordiformi* Cat. H. Ac. Lugd. *Bintamburiù Zeylan.*

5 *Convol. maritim; majore folio Chinensis. an Sarsa litoralis. s. Convol. maxim; Brasilies. Pison.*

6 *Convolvuli instar Volubilis è Coromandel umbilicatis foliis crassis acuminatis, villosa. an Pada-Valli, s. Pada Kelenga sive Muschega-Pada H. M. P. 7. forte ad Bryoniæ genus, potiori jure relegaṇda.*

TAB. XXV.



Tab. XXV.

f. 1. Convolvulus American; sub Ialapiæ nomine receptus an Convolvul; Colubrinus Pison? Caapeba s. Convolvul. Brasi-lian; flore octapetalo monococcos Ray. Histor?

2. Convolvul; s. Volubilis Americ. Bryoniæ nigræ nervosis fol. basculis semniferis, triquetris. Helxine fruticescens. Bryoniæ nigræ foliis, capsulis triquetris amplis, pergamenis. D. Banist. Cat. stirp. Virgin. an Capreolata Bryoniæ nigræ folio Brasiliens. tricocca Marcgrav.

3. Convolvulo similis Bryoniæ albæ foliis villosis, ex India Orientali. an Nehoemeka H. M. P8. Tab 19? Hæc autem pro synonymo Bryoniæ Zeylan foliis profunde laciniatis Cat. H. Ac. Lugd. à Cl. Comelino ponitur. Annot. in loc.

4. Convolvulo similis villosa, foliis crassis, subrotundis, è Maderaspatan.

TAB. XXVI.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 4.
Collins sculp.

Fig. 7.

Tab XXVI

1. Corallina latifolia 2. Opuntia marina Cortus. Fucus folio rotundo C.B.P. Sertolaria Imperati, Scutellaria 3. Opuntia marina I.B.
2. Corallina fistulosa fragilis, internodijs prælongis, lævibus, albis, Farciminum modo catenatis. Corallina fistulosa fragilis I.B.
3. Cornus Virginiana flosculis plurimis albidis ex involucro tetrapetalo rubro erumpentibus. D. Banist. Cat. Stirp. Virg. apud D. Ray. Hist.
4. Cucumis Bryonoides Bisnagarica fructu parvo, florum calyce muricato. an Mucca Peri. H.M.P. 8.
5. Cuscuta ramis Arborum innascens Carolinianâ filamentis lanugine tectis. Musæi Courtenian.
6. Cuscuta lendiginosa tenuissimis cirrhis è Terrâ Maridnâ. Cuscuta Americana super arbores se diffundens. Ray Hist. app.
7. Cytisus Americanus flore luteo spicato; foliis suprà virentibus, glabris, subtùs lanugine argentatis.

TAB. XXVII.



Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 4.

a.



Fig. 3.

Fig. 5.

Tab. XXVII.

1. Chrysocoma affinis Peruviana frutesc. Cat H. Ac. Lugd. App. Aggerato affinis Perijana frutescens Parad. Bat. Prod. Quinquina s. Arbor amara & Febrifuga quibusd. falsò & fastuosè nuncupata.
2. Eupatorio affinis Virginiana frutescens foliis Chenopodij glaucis. Senecio frutescens Virginiana Atriplicis folio Raij Hist. & app.
3. Ephemerū Bengalense serpens folio subrotundo brevi phalangoides. an Ephemerum Africanū annuum flore dipetalo Cat. H. Ac. Lugd. Dipetalos Virginiana foliis Gentianæ, aut Plantaginis Marcgr. Ray Hist? fortè etiam Gentianella Indica. Bonty. p. 154.
4. Ephemerū Phalangoides Maderaspatens. minimum foliis perangustis perfolialum, fortè Acoracoidan s. Potamogeiton Mexicanū. Hernand. Planta palustris & lenta quæ statim comprimentib; cedat digitis, huc etiam pertinet Tali-pillu H.M.P. 9 T. 63. p. 123.
5. Euphrasia lutea latifolia palustris. Ray Hist. an Cristæ Galli affinis planta Romana, s. Crista Galli major Italica J.B. quæritur & ipse Eruditiss. Rajus ubi supra.

TAB. XXVIII.



Tab. XXVIII

f. 1. Euphrasia 3. Crateroonum foliis brevibus obtusis Jostmerlandicum Ray Hist.

2. Euphrasia pratensis minor purpurea Park. Euphr. purpureum C.B. Prodr. Euphr. 3o non scripta Fab. Col. ecphr.

3. Ericæ facie Polygoneides summitas cum floribus.

4. Ericæ facie Polygoneides Africana pentapetalos, siliculis in cerbervinæ capilla menta squammulis constata diffusis. Limonium foeniculaceo folio, Grisley Virid. Lusit. ut humanissime nos monuit D. Gulielm; Sherard. Collegij S.ti Johannis in Academ Oxoniens. socius. & Polygoneides pertissimus. cujus munere summitatem accepi, ramulum autem à D. Johanne Fishwick. ad maritimas Africæ oras à seipso collectum & ad nos transmissum, obtinui.

5. Evonymus Jamaicensis, rotundifol. capsulis coccineis clavatis bullatis Barist. Cat. Stirp. Virg. litt. a. semina ad natural. magnitud. demonstrant.

6. Evonymi Cujubinus foliis Carolinianus. fructu parvo ferè umbellato. b. b. semina ad æqualem dimensionem significant. Asphodelorum similitudinem Rhamno Catharctico (ni fallor) hanc plantam, Spinæ Cervinæ Barbadensibus nostratibus nominatam.



Tab. XXIX

1. Ficoides. 1. *Melocactos mammillaris alabra. sulcis carens, fructum suum viridi-, jucundum, an Echinomelocactos minor lactescens absq. lomento. cylindris laxioribus, Parad. Bat. Prodr.*
2. *Ficoid. 1. Melocactos minus lanuginosus, spinis multoribus, fructu aparvino coccineo an echino-melocactos tuberosus. 1. globularis min. Cat. H.R.P.*
3. *Ficoid Americanus 1. Cereus erectus cristatus folijs trianoularib, pro fundo canaliculatis. Cereus spinis crebrioribus horridus. Ray Hist. Jamacarú prima Pison. Hist. Lusitanis Cardon. an planta pinnata arundinacea Park. Theatr.*
4. *Equizetum. 1. Hippuris lacustris, folijs mansu arenosas Gesnero Ray Hist. Hippuris coralloides Ger emac.*
5. *Frutex Corimandeliensis baccifer. Mali. Granatæ folijs amphoribus, noster Ray Hist. 1801.*
6. *Frutex Gangetic, Alterni folio spinosus. Frutex aculeatus Orientalis Ilicis folio noster Ray Hist.*
7. *Frutex Bisnagaricus spinosus, Coryli folijs densis, spinis brevioribus crassis.*

TAB. XXX.



Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

1. Filix amplissima lobis pluribus lacinulis Cantabrica. Polypodium Cantabrigiense pinnulis ad marginem lacinulis Raij. Hist.
2. Filix e China genus molle, auriculis ad caudam foliorum superne profunde summo pilis tomentis mucronatis
3. Filix Polypodium Indicum [illegible] Paul. Quadripart. Botan. 302.
4. Filix polia Corylus aspera maxima Cubensis

TAB. XXXI.



Trew.

1. Tribulus bicaspis e Cymandel Zeylanis, caulis & ramuli puncta[ti] fol. plurimis ex uno tubercolo provenientib, apud Ray Hist. p. 1809. an bibis = Tribulo spec[ies] indico Orientalis.
2. Tribulus bicaspis foliis Lun. vel Cassiae Pochecco Maderaspatensis noster Ray Hist.
3. Agerato similis Indica Maderasp. Zerumar. folijs ad basin radicalis an Commun cujus aliquula a D. Terentio ex India missa & Vitalis herba Anil inscripta fuit C.B.P. Ageratoides ejusdem C.B.P. Anil Nil Indorum color I.B. bal herba foliis Matronique similis Garzia. Anil Indico dicti Nil Herba Zerumarum facie. Amischot. part. 4. Lact. Orient. Agerato affinis Eupatorii hujus radicata, vel stellata I.B. (1.2) sparte triphyllo C.B.P. valde similis situ eadem, flore, quam proxima est cujus acuminatis foliis C.B.P. quod D. Tournefortius noster D. Sherard ex Hispania sententia Cubas radius flore luteo hirsutius Cat. Patav. a Turre Cretica foliis argenteis flore luteo dulce. Notitiae caulis angulati sed profunde canaliculati ramos propter dispositionem arbitramur. Quam ut audio praeparant e viridi colorem indigenae Peruani Bissagi &c. alibi, in locis nunc Orientalis.
4. Geranii pusilli supini maris Alth. aut Pelargoni folio nostras Ray Hist. Geran minimum procumbens foliis Betonicae Moris. Hist. 2.
5. Gnaphal. Lusitan. comis argenteis an Chrysocome spinosa candidissimis floribus Breyn. Cent. forte etiam gnaph. majus angustioblongo folio alterum C.B.P. Filago Germanica alterum foliis lanceolatis. Lob. Icon.
6. Gnaph. majus lato oblongo fol. C.B.P. syn. 2.m Platean. Chas. Hist. gnaphal. stoechadi citrinae accedens I.B. Elichrysum silvestre latifolium capitulis conjug. C.B. Pluyt.
7. Gnaph. imptum s. Filago dicta Cap. Bon. spei gnaphalio Platani & simile genus, sed diversum.



Tab. xxxii.

f. 1. Gramen Arundinaceum Halepense, Tragopogonis fol. paniculâ miliaceâ, hui⁹ exemplar eximij Botanici D. Hac. Bobart Hort. Academicæ Oxon. Præfect. communicatione in Herbario nō. vivo servatur.

2. Gram. paniculat. gallo-provinciale Aquileiæ semine. Schol. Botan. a D. Gulielmo Sherard. accepi ebam.

3. Gr. junceum aquat. paniculis cum fol. capillaribus; simul orbis proliferum. aīn Gr. junc. capsulis triangul. caulicul. tenuib⁹ foliis ad nodos, e panicularum divaricationes prælongis. Rāy Hist.

4. Gr. Alopecuroid. spica max. Ind. Orient. Gr. Alopecuroid. Indic. max. Rāy Hist. est panici genus.

5. Gr. parvum repens. Ἰυσιχώφορον. Tamaricense spicâ longiori compressa.

6. Gr. Μηλοκόφορον ὀξυφύλλον. Carolinianum, s. Gr. altiss. panic. maximâ speciosa, e spicis majorib⁹ compressiusculis ubriñ. pinnatis Blattam molendinariam, quodammodo referentibus, composita, foliis convolutis, mucrone pungentib⁹; aīn Gr. marit. max. Curaſsanic. paniculis divisis P. B. P. hujus ad exculpend. nobile specimen nobis dedit Insignis & in omni Naturali scientiâ vir magnâ judicij solidit ate, si quis alius præditus D. Gulielm⁹ Courtēne. olim condiscipulus, & semper mei amicissimus.

7. Gr. exile durisculi marit. foliolis circumvolutis deluli junceis brevibus. Gr. pumilum Loliaceo simile, Rāy Synop. Stirp. Brit.

TAB. XXXIII.



Tab. XXXIII.

1. gramen spica Bruc minus CBP. IB. Park.
2. gr. hordeaceum à maximus pumilum. gr. secalinum palustre, & marilim. Ray Hist. an gr. Hordeo disticho simile CBP.
3. gr. caninum marit. spicatum CBP. gr. calmar. spicat. Monspelienſ. Park. gr. can. marit. spicat. Casparo Bauhino I B.
4. gr. marit. spica lobacea, fol. punctatis, nostras. an gr. sparseum spicat. fol. mucronatis, vel spica Secalina CBP. Sparsum spicatum pungens Oceanicum IB.
5. gr. Phalaroid. spica brevi reclinata ex utriculis prodeunte, an gr. Phalaroid Lusitanic. Ray Hist.
6. gramen. Alopecuro: accedens ex culmi geniculis, spicas cum petiolis longiusculis promens. gr. secalinum arvense spica laxa pyramidali. Ray Hist.
7. gr. mont. hirsut. foliis spica leucophaea diruptâ. gr. pumilum hirsut. spicâ purpuro-argentea molli nostras Ray Hist. His duab. novissime monentis gramin. speciebus, multis aliis nos ditavit ex propria collectione amicissimus vir D. Samuel Doody. Pharmaceutices & Rei Herbariæ callentissimus.
8. gr. typhinum marit. minus Ray Hist. an gr. typhin. Danicum minus Park. quærit & ipse Clarifs. Rajus.
9. gr. parvum præcox spicâ laxâ canescente Ray Cat. Pl. Angl.
10. gr. panicul. bromoid. minus, paniculis aristat. unam partem. spectantib, Ray Hist.

TAB. XXXIV.



Tab xxxxiiii.

1. gr aveñaceum parvum procumb. paniculis non aristatis Raiv Hist. Pl. univers.
2. gr capillaceum secundis paniculis non aristatis Raiv Hist. gr pumilum Bauhini pin Hist Lugd. gr foliolis juncei brevibus viridi nigrâ & albâ C B pin & prodr.
3. gr cæspitosum angustifs. spicis parvis sessilib, in glomerum dis Raiv Hist.
4. gr cyp elegans spicâ compositâ Raiv Cat Pl. Ang. (vel ad spiculigeratum nullum appenditur folium, & in Hist. spicâ compositâ asperiore) legitur).
nostri lamat spica mollis est. & folium et superatum habet.
5. gr cyp. pedunculis flavicans spicis brevib, prope summitatem caulis Raiv Hist.
6. gr cyp pedunculis lanuginosum Raiv Hist. an gr cæspitosum Nervi unum pauium lanosum Park.
7. graminea cyperoides monti Ballon simile spica solit. & flaviens spicis compositis Raiv Hist. an gr cyp elegans multiferâ spicâ Park.
8. gramen cyper. monti Ballon simile humilius in maritimis & arenosis nascens. Raiv Hist.
9. gr cyperoides spicâ simplici compressa distichâ. Juncinel. Raiv Hist. & Hirp Bril. & Hist.
10. gr cyp. maximum semimb, deorsum reflexis, pulviformibus Raiv Hist.
11. gramen Cyperidæ accedens glabrum in palustribus provenions paniculatum. an gr cyp palustre leucanthemum Raiv Hist.



Tab. xxxv.

1. Gr. junceum clavatum minus, 3. Holosteum palustre repens foliis capitulis, & seminib; Pylli Rāy. Synops. Stirp. Brit. & Hist. à Reverendo viro D. Matthæo Dodsworth Evangelij prædicatore diligentissimo, & Botanices eorum numero nequaquām postremo nobis primùm ostenditur.

2. Gram. junceum 2. Holosteum minimum palustre capitulis quatuor tenuissimi staminib; donatis Rāy. Syn. Stirp. Br. & Hist.

3. Guaiacum Jamaicense Lentisci subrotundis foliis lœtè virentibus, flore albo. Guaicū Officinar. Parad. Bat. Prod. Guaiac. foliis Lentisci. & BP. Guaiaci ramulus Clus. ad Monardem. Guaiac. Terentij apud Hernāndez.

4. Guaicū Jamaic. foliis deluti muriâ conditis, spissis virentib, flore subceruleo. an Guaiacum foliis Ceratonicæ, Aceris. 1. Buraee pastoris fructu, flore cæruleo Breyn. Prodr. 2.

5. Gratiola affinis è Coromandel foliis superiorib, Rubiæ quadrifoliæ crenatis, imis Coriandri modo tenuissimè divisis.

TAB. XXXVI.

Tab. XXXVI.

1. Alsinastrum humile erecta semine folliculis membranaceis bivalvibus in latitudinem perrectis, & utrinq; recurvis, longe pedunculo insidentibus, clauso. Hal. angustif. semin.
   ibus, lanceolatis, bracteis Aurseæ pastoritiæ emulis, binorum, inclusis. Ray Hist. app. an Halim. min. Germanic. Park Halim. min. CB. pin. et Halim. aurea
   ibus, lanceolatis, bracteis Aurseæ pastoritiæ emulis, binorum, inclusis. Ray Hist. app. an Halim. min. Germanic. Park Halim. min. CB. pin. et Halim. aurea
   -ei Guisd. prodr. hanc etiam in maritimis Britanniæ majoribus speciebus adnumerat. eandem appingi videtur. iterumq; apud Bodæum à Stapel. Amst. in Theophr. pag. 509.
   -ibus, ovatis, acuminatis apud Cl. Paulin. ad Pentaphacen marinam pertinere videtur. eandem appingi videtur. iterumq; apud Bodæum à Stapel. Amst. in Theophr. pag. 509.
2. Hedera amœnophylla, foliis viridibus, Hederæ arboreæ Virginianæ umbilicatæ foliis florem pappos CBH HRP. Hedera virginiana. Clematis facie, radice flavescente.
   Hedera amœnophylla, foliis viridibus, Hederæ arboreæ Virginianæ umbilicatæ foliis florem pappos CBH HRP. Hedera virginiana. Clematis facie, radice flavescente.
   cal BNL. alino flores purpurei coronantur ad Clematitis vel Asphodeli florem, albos. an Tourn. Xochitl Mexic. Hernand. Heliotrop. Americ. minus glabrum folio.
3. Heliotropium majus spicatum, Indicæ procumbens, glaucophyllon floribus albis. an Tourn. Xochitl Mexic. Hernand. Heliotrop. Americ. minus glabrum folio.
   incurvo clauso. Br. Pr. 2.
4. Hemionitis laciniata speciosa folio Securis Romanæ figuram æmulante. Hemionitis parvo Antigoatia folio Platani fere in modum divisa Ray Hist. app.
5. Hemionitis laciniata speciosa folio Securis Romanæ figuram æmulante. Hemionitis parvo Antigoatia folio Platani fere in modum divisa Ray Hist. app.
   ab honestissimo Juvenc D. G. Koxnel ex Antigoa insula in Patriam reduce 1705 accepimus.
6. Hemionit. Ind. Orient. Phagis caule folio aliquatenus acuteus. an Hemionitis multifida Zeylan. Codd. sagittata s. Filix foliis integris Zeylanica pediculo alato. Breyn Prod. 2.
7. Hemionitidi affinis Americana Cephyllanthos, folio simpliciter pinnato. Hippoglossi cæmulo, radice reptatrice lignosa, ad foliorum crenas florida.

TAB. XXXVII.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

1. Hesperis prodromi hortensis Molluginis ad imaginem degenerans.
2. Hieracium folijs ex floribus Dentis Leonis bulbosi semiste curvo. Moris. Prælud. Dens Leon. folijs radicalis Bell. Monsp. Dens Leon. minor folijs radicalis. C B. prodr. & pin. cui & Trinciatella Italorum Camerar. Hort. Med.
3. Hieracium s Bieselle majoris species folijs variis dentatis flore singulari nostras.
4. Holosteum s Scleronopus serpentina folijs betonicæ angustis, spicâ Rubiæ spicatæ gracili. an Holost. strictissimo folio minus C B P. serpentina ovum. minim. Lob. Icon. Holosteum nobis hi. allatum optimè convenit cum Descriptione Plantæ quam Joh. Bauhin. inscripsit pro Corono nopo serpentaria ovum minima proposuit in quâ tamen schola caulículis adnexa non conridet.
5. Hyoscianus pibellus aureus Americanus Antirrhini folijs glabris, forte Hyoscyami albi Æthiopij Verlingidæi. baccis minor ex America, hujus unum aut alterum plantam a seminib, ex America delatis curâ & diligentia D. Georgij London Reginæ nunc Hortulani, & de Rebus Botanicis optimè meriti, provatam comprexim, in Horto culisimo novisque variorum undiq; conquisitis simplicium instructissimo, Honoratissimi Domini & Reverendi admodum in Christo Patris Henrici Compton Episcopi Londinensis, omnium Botanophilorum Mecœnatis colendissimi.

TAB. XXXVIII.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Tab. XXXVIII.

1. Jacea latifol. caule alato capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo e squamularum cuspidib. orto. Jacea latifolia spinos. caulinis viridib. flore purpur. purpureo I.B. an Jac. Cyanoid. altera alata caule Cyanus Creticus spinos. Belgarum. Cat. H.R.P. Jacea foliis sordide candicantib., purpu CBP. Jacea purpurea balaustina muricato capite Clus. cui & ille adscribit folia sordida candicantia.

2. Jacea montan. alata caule purpurea ex sinuatis capitular. squamis spinosis, plurimis in semicyclum dispositis. Jacea mont. purp. echinato capite Park. Jacea Cyanoid. echinato capite. CBP. Jac. mont. comm. capite Clus. forte etiam Jacea capitulis hirsut. Beckij Ger. emäc. sub hoc enim titulo multis abhinc annis et à D. Edvard. Morgan. vive in Rebus Botanicis haud infimæ notæ accepimus.

3. Jacea spinosa Sonchi angusto folio, maritima, minor, cal squamas capitula, spinulis plurimis.

4. Jac. spinosa Cyani majoris folijs in caulium desinente squammis cum ciliorib. spinis. an Jac. nigr. angustif. vel Sulphospermi arvens. fol. CBP. quæ in prodr. item Jac. nigra angustif. alt. fol. longioribus, sanguineas, sicca, prodr. forte etiam Jac. min. fol. acutiis. Cyani majoris nomine missa ejusd. Append. Frigitana Centauroid. echinato capite bilbilio ex imaginj, squalida plurimis aculeis circumdrilor radiatis. Hunc proxime accedit verus Sallor eadem est Jac. capite longis aculeis spinoso CBP. Quam iste vir nomine & in arte Botanica ἐξοχὴν ὁ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ. à Jac. mont. echinato capite Clus. diversam esse recte pronunciabat. Centaurij marini no mine ad Casparin. Bauhinum D. Bolanus misit.

TAB. XXXIX.



Tab xxx ix

1. Jac. laciniato Senchi fol. s. latifolia purp. capitulo spinos. C BP. ex capitulor. squamis spinulæ plures pulchro ordine stellam dimidiatam referentes. alæ deorsum tendentes exeunt. quarum media cæteris latiores longior evadit.
2. Jac. min. Stœbe Gallicæ & Austriacæ accedens. squamis capitulor. crebrioribus. quarū singulæ unico saltem aculeo sunt armatæ.
3. Jac. min. exotica ad foliorum margines spinulis donata.
4. Jac. min. Attica capitulis plurimis ex apicibus squamularum spinā rectā singulari. à doctissimi pariter ac humaniss. necnon Reverendi admodum viri D. Georgij Wheeler. Eq. aur. liberalitate accepimus.
5. Jacobæa lanosa foliis brevibus subrotundis Alcellæ floremipense flavo. an Jacobæa lanata foliis brevibus subrotund D. Bau. cat. Sharp. Virg.
6. Jacob. pumila Absinthij Umbelliferi foliis incanis. floribus, velut in Umbellam positis. an Chrysanthemum Alpin. 1m clus.
7. Jacob. pumila sinuatis foliis argentea. summo caule flore singulari. Ingenioso viro et Chirurgo Londinensi D. Paraeo hujus communicationem debeo.
8. Iberis Americana latioribus & serratis foliis. ad caulem virgultillatis.



Tab. XL.

1. Juncus acutus maritimus caule triquetro rigido, mucrone pungente. ait Juncus acutus maritimus caule triangulo. C B P. 11. & Prodr. 22.
2. Junci acutus maritimi, caule triquetro maximo molli & procerior nostras.
3. Junci acutus maritimi caule triquetro molli spica glomerata in Stylo sessili.
4. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. C B P. Juncus acutus maritimi alter. Pock.
5. Juncus minor acutus maritimus prolifer: secus caule capitulo multo.
6. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti. Ray Hist. Junci mont. parvus cum parvis capitulis luteis I B. Gramen spartium capitulis Equi seti. Merett. Pin. Rer. Nat. Brit.
7. Juncelli cujus minimi capitulis Equiseti Ray Hist. primus ejus Inventor fuit amicissimus Vir Regi Herbariæ amantissimus S. Matth. Godsworth. qui et jam olim hujus exemplar optime exsiccatum nobis benigne communicavit.
8. Junci rarigus culmo supra paniculam compactam longius prodito Ray Hist. in Westmorelandiâ invenit ille Strp. Britannicar. explorator. dilectissimus. D. Jacob. Newton. cujus munere accipiebam.
9. Juniperus Caroliniana Thujæ ramulis fusis, & compressis odoratior. an Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente C B P. Thujæ genus 4tum Hist. Lugd. 51.

TAB. XLI.



Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 6.

Fig. 3.

Fig. 4.

Tab. XLI.

1. Lamium album Paritariæ folio virginianum. Lamium Paritariæ facie Moris. Prælud. Bot. 278. Lamiii Paritariæ foliis Ic. Roberti. sed hujus Icon minus placet. an Lamium album non fœtens folio oblongo minus cat. HRP. 99. Lamium Paritariæ folio Bruynero Lonquet Hort. 69.

2. Lamium pusillum rubrum Paritariæ facie Americanum. an Lamium Novæ Angliæ Paritariæ foliis Raij Hist. 560.

3. Lam. rubr. minus foliis profunde incisis Raij Hist 560.

4. Lam. Cannabinum aculeatum flore speciosо luteo. labijs purpureis. Cannab. spuria flor. speciosо luteo. labro purpureo Raij Hist. 561. an Cannabis altera spuria Park. pag. 599. an Urtica aculeata foliis serratis altera CBP. 232. quærit & ipse cl. Rajus.

5. Lappula Bengalens. tetraspermos Ribesij folio echinis orbicularib; ad folior exortus plurimis simul sessilibus. an Alcea Indiæ Orientalis fructu lappacео folio Ribes Breyn. Pr. Nexpayan Mexicensium Hernand hùc pertinere videtur.

6. Lentiula palustris Indica foliolis subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis.



Tab. XLII.

f. 1. Leucoium. 3. Lunaria baseule sublongo intorto Raÿ Hist. 739.

2. Lichen parvus erectus foliolis profunde laciniatis. an lichen minimus; foliolis laciniatis. Raÿ Hist. 1206. in Umbrosis humidis ad parvulum flumtian juxta Tandy medicatos apud Dolvectum, quatuor circiter milliaria a Londino dissitum, in agro Suersiensi, copiosissimum invenimus.

3. Alio narcissus. 3 Narcissus duplex Carolinianus, flore albo, singulari, cum rubedine diluto, ab honestiss. viro & Hortulano admodum industrio. D. Gulielmi Darby, accepimus ad quem huj, radices plurimæ ab amico suo è Carolina allatæ sunt, & in viridario suo jam nunc superbiunt apud Hogsdeden, dicum Londini ad aquilonem suburbanum. lit. a. capsulam triquetram semirab; appletam significat.

4. Limonium reticulatum supinum Boccon. de Pl. Sicul. pag. 32.

5. Limonium minimum cornutum elegans an Limon minus densa cauliculi fasciculati deluti coma Lœl. Triumfet. catal. apud Fratrem. p. 65. forte etiam Limon. Ferulæ folio Boely. Park. 1236.

6. Liquid-ambari arbor. 3. Stymacifera Aceris folio fructu tribuloide, (i e) pericarpio orbiculariex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens. Oexsol. Indorum Monard. apud Clus. 302 Xochicoltzo. Quahuill. Mexicens. Hernand. Styrax Aceris folio Hon. Belli. CB. prodr. Styrax arbor virginiana Acerisol. Raÿ Hist. nec dar nec Platanus proprie dici potest. est enim quædam Heterodyta & sui generis Arbor. lit. a. fructum muricatum: cujus a transversam sectionem. b. indicat. ec. semina.

7. Lithospermum angustifol. umbellatum CB P. 258 & in append. 521. Park. Paul. Boccon. de Pl. Sicul. pag. 77.

8. Lychnis Alpina muscosis foliis densius stipatis floribus parvis. Calyce duriore. ab Oxymoide muscoso Park. plurimum differt.



Tab XLIII.

f. 1. Lotus arguntea Cretica. Lotus κοκκινόκαλος frutticosa Cretica argentea, siliquis longiss. propendentib; rectis Moris. Hist. 2. (nostræ tamen siliquæ pendulæ non sunt sed sursum vigescunt.) an Lotus inanus major C. Bauh. Pin. cornículatum siliquâ grandi. incanum maritim. Ray Hist.

2. Lotus frutticosior Africana, foliis incanis. floribus binis. amplis, luteis. a D. Isaaco Fishwick accepimus.

3. Lotus tetraleobos minor Cretica. s. Lotus parva Cretica procumbens, incana, quaternis siliquis cruciatim dispositis. Candie Leforuce.

4. Lychnis caryophyllaeus virginian; Gentianæ folijs glabris. quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus flore amplo fimbriato. noster. Ray Hist. App. 1805. huic forte pertinet Cloquillic Mexicensibus. s Herba geniculata Hernand. 210.

5. Lysimachiæ Ephemeron dictæ. genus Maderaspatense. Limonij folijs subrotundis. caule crasso fungoso. lit. a. florē expansū ostendit.

6. Lysimachiæ spicatæ purpureæ affinis Thymifolia. flosculis in caumane plurimis, quasi in nodis junctis. Anthyllis forte Prosp. Alpin. ex ol. hujus specimen Reverend. Dñi D. Geo. Wheeler. è Græcia (quâ invenit) rediens nobis munere donavit.

7. Tithymalus botryoid. Maderaspatens Hyperici folijs non crenatis. floribj; ex alis uno versu provenientibus. inter Lysimachias in Tabulis nostris p errorem transpositus.

TAB. XLIV.



Tab. XLIII.

f. 1. Lysimachia non papposa Meliophylla Maderaspatana. forte Melochiæ genus siliquâ quinq; capsulari.

2. Malva Tingitana. flore Cæruleo parva.

3. Malo rotundifolia. glabra ex Hispaniâ flore amplo rubello.

4. Malo Gallo provincia laciniata s. Alcea tenuifolia. Pulsatillæ foliis. flor. ampl. rubente. Alcea tenuifol. humil. maritima. Gallo-provincialis fol. inferioribus nonnihil ad Geranium accedentibus. Sch. Bot.

5. Malo. Orientalis. elatior longiori fol. fl. alb. minimo. capsulis conglomeratis. an Malo. frutex. Melochiæ angusto fol. floribus alb. fasciculatim. congestis. Par. Bat. Prodr. inter addenda.

6. Mandarù Maderaspatense foliis firmioribus, parvis bisulcis. glabritie splendentibus, ad Surculum densius stipatis.

7. Muscus polytrichoides dentior foliis angustis pellucidis & fere membranaceis noster Ray. Synops. Stirp. Brit.

TAB. XLV.



Fig. 1.
Fig. 4
Fig. 2.
Fig. 8.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 5.
Fig. 3.

Tab XLV.

1. Marrubium aquaticum s. aquatile foliis tenuius dissectis Moris. Prælud. forte Marrub. palustre hirsut. tenuius laciniatum CB Pin. & in Prodr. nostri tamen folia sunt omnino glabra.
2. Marrub. an potius Cardiaca foliorum apicib. in prolongam barbulam extenuatis, verticillis florum petiolis in mentibus. an Marrub. ex Aleppo verticillis longis pedicullis insidentibus Cat. Hort. Edinburg.
3. Matricariæ Achaovan. dictæ similis, Eupsimi foliis, Absinthij sapore Jamaicensis.
4. Melilotus lutea Indiæ Orientalis erecta, folliculis rotundis, parvis, spicis florum ex foliorum alis multiplicatis.
5. Melilot. Indis. humil. erecta floribus exiguis odorat. albis, pectinatis majoribus, spicidum densius stipatis Sundadi-pullu Hort. Malab. P. 9.
6. Mentha hirsutior Βραχυστομος & Cardiaca. C. B. Doody. accepimus.
7. Muscus polytrichoides humilior foliis latis subrotundis Adiantum aureum humilius fol. latis subrat. Ray Hist. an Mus; Trichomanis facie Jungermanni foliis ultrinq; rotund. splendentib. Cat. Aldorf.
8. Melilot. lutea minima prostrata foliis minoribus crenatis an Melilot. Messanens. procumb. folliculis rugosis sublong. spicis florum brevioribus, Ray Hist. Cat. Extract.

UMI

TAB. XLVI.



Tab. XLVI.

1. Mespilus arulcata Apij folio dentiulato splendens fructu insigni rutilo Virginiensis. an Mespil. virginiana colore rutilo CBP. hujus folia aliquando variant, & semper multum laciniata evadunt, olim Horto Nobilis. viri D. Caroli Howard. prope oppidum Barkin in agro Surriensi observavimus. hujus folium ad lit. a in Tab. expimitur.

2. Mespilus Prunifolia Virginiana. non spinosa fructu nigricante. Rhamnus virginiana Prunifolia fructu nigro. ossiculo compresso Banist. Cat. Strp. Virgin. &. Mespilus 2. Sorbus torminalis virginiana folio latiss. fructu nigro Sch. Botan. forte etiam Mespilus spinosa 2. Oxyacantha virginiana nigra Cat. HAL. si saltem aliquando inermis fuit spinosa. v. ubi magis domestica spinis careat. ut accidit in Anthedone Azarolo Casalp. Theophrasto, monente, nostram autem unquam spinosam fuisse nemo haud persuadere possum. b. ramulum fructu onustum significat.

3. Mespilus Virginiana. Apij folio vulgari similis maior grandioribus spinis.

4. Mespil. Apij folio Virginiana spinis horrida. fructu amplo coccineo. Mespilus Apij folio Indica Sch. Bot. Mespil. spinos. 2 Oxyacantha maxima virginiana Cat. HAL. Oxyacantha Ossiculo binis fructu magno inclusis Banist. Cat. Strp. Virg. Oxyacantha Amoris Gallis calcar dicta. R.S. Inst. Ray Hist. hujus Arbor Spina Glastonburiensis, Spina Christi. & Spina Sancta per errorem dicti solita est. lit. a Surculum cum aculeo armatum b. b. ossicula demonstrant.

TAB. XLVII.



Tal. XLVII.

1. Millefolium Tanaceti folijs flore albo Moris Pradud. an Corymbifera Millefolij Umbelliti folio alato ♀ Lunaria Ray Hist.
2. Muscus clavatus Cupressoides squamis luteoribus compressis obtusis nitens noster Ray. Syn. Stirp. Brit. app.
3. Muscus clavatus Cupressoides Cupressus nigrescens splendens noster Ray. Syn. St. Brit. appendi.
4. Muscus montanus ex caulis ramosus, bifidis longioribus obtusis an Muscus ramosus erectus minor CB. pin. 12 prod.
5. Muscus Alpinus ramosior erectus flagellis brevioribus sanguineus an Muscus terrestris ramosus erectus major CB. pin. 12 prodr. Muscus montanus Tab. Icon. forte eiusdem Muscus surculis capillaceus Morett. Pinac.
6. Muscus parvus stellaris CBP. Park. Adianthi capituli Muscus in ericetis proveniens IB. Hist. Lob. Icon. sed figura non placet.
7. Muscus terrestris erectus minor polyspermos Ray Hist. 12 Synops. Method. Stirp. Brit.
8. Muscus terrestris repens pediculis foliaceis binis clavis in altum se erigentibus. Muscus aliis terrestribus Lycopodium Dodonæi Hist. Lugd. qui a Musco terrestri 2. quod Histor. (sic) terrestri repente a Lycopodio pedo IB. plurimum differt licet in Pinace suo Casp. Bauhinus, abillo non separat. sed plane utrumq; conjungit.
9. Muscus Cupressus, erectus perpetuo virens in arboris præcritatum extrestens. an Quamiacatl. s. Spica arboris Hernand. Hist. Mexic.
10. Muscus coralloides multifido capillaceo folio. Palmites pelagica nigra. Muse, capillac. multifid. nigr. CBP. adde a. Palmites pelagica alba depingitur. Muscus capillac. multifido folio albido. CBP. Coralloidæ affinis 2. Muscus marinus tenuis capillo IB. Muscus marinus vulgatissimus, Lob. Icon. p. 2.
11. Muscus marinus dentriculatus, procumbens, caule tenuissimo, denticulis bipagis Ray. Histor.
12. Muse, pentatus. ramulis 2 capillamentis falcatis Ray. Hist.
13. Muscus marinus Neapolitanus Park. Coralloides tenia seminudus IB. Tuus semicularus colore livido nobis Raij Synop. app.

TAB. XLVIII.



Tab. XLVIII.

f. 1. Muscus aureus capillaris palustris inter folia folliculis rotundis res. similia D. Doodij quadripartitis. Gramini folia palustris repens. bosculis granorum Piperis cornutis. Raÿ. Hist. & Synops.

2. Muscus pluvialis, pennati, rubris ramulis numerosis mollib, latius se sparg entibus. an Muse, marin, rubens pennatus nostras. Raÿ Hist. item Muse, marin, purpur. parvus. foliis oblongis. Millefolii fere divisurâ. ejusd. Hist.

3. Muse, marin, denticulatus minor ramulis in crebrissima capillamenta sparsis. an Muscus marinus denticulat, minor denticulis alternis Raÿ Hist.

4. Muscus marinus geniculatus eburneo nitore candicans, erectus caulinulis pinnatis. Muscus marinus candidus coralloides Hist. Lugd. Leh. Icon. p. 2. corallina altera Tabern. Icon. sed figurae minus plane. Muscus coralloid, squammulis loricatus. CBP.

5. Muscus marinus major erectè denticulatus Raÿ. Hist. Mustus Coralloides alter albus Lob. Icon. part. 2. Abies marina Belgica. Clus. Hist. Abiti simiis maritimis CBP.

6. Muscus marin. s. Coralloid non ramosus erectus. ornatus coloris. Adiacentium cornicul. adinstar. geniculatus. Muscus marinus Equiseti formis non ramosus Raÿ. Hist.

7. Myosotis Scorpioides. an potius Heliotropium minus erectum. foliis subtus incanis. è Madera aspatum.

8. Myrti, Brabantiae accedens Africana, baccis carens. Conifera. Arbor Conifera odorata foliis Sabinis, rigidis, leviter serratis Raÿ. Hist. an Laur, serrata odora. Promont. Bon. Spei. Bod à Stapel. in Theoplir. p. 333. ex America quoq, nobis allata est. v à Nostratib, Insulam Bermudensem vimpinbus Laurus odorata, vulgò nominatur. ut ab honestis. viro Jacobo Harlowo. Tradiscimus.

9. Myrti, Brabantiae similis. Carolinensis, baccifera fructu racemoso. sepali monopetalae, fructum fert teliti Sacharo candidiss. incrustatum. cujus ramulus cum fructu, ut per Microscopium apparuit, adpingitur. Hujus pulchri Sanè perrari. & prorsus novi Arbusculi Americani generis. munificentia Illustris viri D. Gubernat Courlenae, compos factus sum.



Tab. XLIX.

f. 1. Muscus polytrichoides angustifolius pellucidus ramosus noster Ray. Synops. Stirp. Brit.

2. Njora Hort. Malab. similis ♀. Madaraspatan. Arbor rz ol. Ceratiæ fol. Corymbosa.

3. Nir-Sihulli Hort. Malab. accedens à Cormandel. Gratiolæ affinis Indiæ Orientalis, Digitalis æmula. ubi tres exhibentur species, seminum figurâ discrepantes, ut litteræ a. b. ccc. denotant.

4. Oenanthe aquatica, Pimpinellæ Saxifragæ divisurâ, nostras. Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens IB. Oenanthe Pastinacæ Sylvestr. folio semine Atriplicis CBP.

5. Onobrychis Bisnagarica, Mimosæ folys, siliquis adunum solummodò latus dentatis, ex alis polyceratos.



Tab. L.

f. 1. Onobrychis minor flore parvo purpureo siliqua echinata majoribus aculeis. Raij Hist. Onebrych. minor, siliculis echinatis cristatis majoribus, v. crassioribus aculeis prædita donata Morisi. Hist. 2. an Onebrych. fructu echinato minor. CBP. item Caput Gallinaceum minus ejusd. pin. & prodr. Onobrychis. s. Caput gallinaceum, minus, fructu maximo, insigniter echinato, Lobel. Trimestelli. Cat. apud Sibtorp.

2. Onobrychis minor foliolis cordatis, siliquis magnis, asperis, compressis. deluti isthmo interceptis, floribus in globum congestis. an Onobrychis foliis dictæ, fructu echinato major caulescens & ramosa Schol. Botan. an Onobrychis semine clypeato aspero minor CB. Pin. & Prodr.

3. Onobrychis Sanctica monophyllos, siliculis singularibus, lævibus, falcatim per internodia discriminatis.

4. Pai-parova s. Souradi Hort. Malab. similis. Anon eadem. Frutex baccifer Malabaricus; fructu plano rotundo piloso tetrapyreno. Raij Hist.

5. Persoliata alpina angustifolia minor CBP. quæ 4.ta in Prodromo. Park. Theatr.

6. Persoliata minor angustifolia, Buplouri folio CBP. Persoliatum angustifolium montanum Col. ecphr. 247. Persoliata angustifolia Alpina minima Park. Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea Valerandi. & Dalechampy. IB. Hist. tom. 3. lib. 27. p. 201.

TAB. LI.



Tab. LI.

f. 1. Palma Jamaicens. non spinosa humilis, folio multissimo flabelli formi, Arapunga Malabar. haud absimili.

2. Phaseolus maritimus purgans, radice bivali, foliis crassis subrotundis, Binagaria, an Phaseolus Brasilicus Florileg. Renevul. tab. 9. Raii Meriannum. Katuzjandi. H. Malab. p. 8.

3. Phaseolus Orientalis Anagyridis folio, siliqua falcata glabra.

4. Phaseoli minimi Madraspatani, floribus miniatis. Melileh adinsin spicati, huc fortè pertinet Ystactlalamatl Mexicanis. Hernand. Hist. 452.

5. Paremythia myosotis Virginiana, foliis subrotundis. Nasturtium myosotis insipidum Banist. Cat. Shrp. Virgin. a D. Robert. amicissimè communicatum fuit hujus optimè observatum exemplar.



Tab. LII.

1. 2. Ornithopodium majus & Madrasapatan. foliis lanugine argentatis.
2. Phaseolus purpureus spicatus Madrasapatens. cordatis & rhizomis foliis. siliquâ utriculatâ nigrâ.
3. Phaseol. minor Pinagaricus foliis argenteo colore villosis, siliquis torosis brevibus, spadiceâ hirsutie pubescent. fructu parvo Scaraboide nigro. ex Phaseol. Zeylan. Salviæ foliis subrotund. mollib. & hirsutis Pavad. Bat. Prodr. stirp. Orob. Phaseoloides Zeylan. foliis Salviæ rotundis vnionis subhirsutis ejusd. P.B.P.
4. Phaseolus Nevisensis. foliis multangulis, tuberosâ radice esculentâ. Phaseolus perennis Martinicensis radice tuberosâ esculentâ, angulosis ornato folio P.B.P. nostratibus. the Turneptree bean.
5. Phaseolis acaulon. Fructus Lophnapatmas spinosus, fructu Ovali, nigris & cinereis punctis, elegantèr guttatis. P.B.P.
6. Pilosella minima, Gnaphalij montani lanosis foliis, flore aureo, nondum descripta.
7. Polygonum minus procumbens, niveum facie glaucis exiguis. Polygonum minus candicans supinum Bokin. Monspel. Polygala repens nivea C.B.P. Polygala repens Nisperorum Obs. & Ic. Lob.

TAB. LIII.



Tab. LIII.

1. Pudri Malabaricæ similis. Arbor è Madera patria. (h. e) Clematis arborea Indica foeniculo folio, flore luteo spicato, minimo, siliquis longis, angustis, quadratis, alato tortivis, seminibus substantiâ lignosâ obductis Breyn. Prodr. 2.
2. Polygalæ affinis Africana glabra, floris galeâ binis tristis simbriatis ornata, ex involucro magno dipetalo erumpente.
3. Polygonum maritimum longius radicatum nostras. Serpylli folio virinato, crasso, lucente Synopse. Stirp. Brit. app. sorte Polygon. minus lentisolium C. B. Pin. prodr. Polygon. minus Monspeliens. Park. huic proxime convenit et Polygon. Herniariæ folijs, sed per amplia radice Astragalii Adv. Lob. si hæc herbula non sit tota incana, nostra autem glabra die opinabit.
4. Polygonum lignosum à maritimus Africanum, azuræ coloris foliorum Bite squammulis pellucidis ornatum. Limonium lignosum Gallas se ens Bocconi huic pertinet, & forte idem est à D. Fishwick, nobis transmissa.
5. Pharmica Virginiana Scabiosæ Austriacæ foliis indyseha. Pharmica Virginiana folio Heleny Moris. Præludi. Prodo costus Virginiana, seu Anonymos corymbifera Virginiana flore albo Ray Hist. hujus specimen fuit ante triginta circiter annos in Horto D. Walker. apud Westmonastrium legimus. cujus filius hanc plantam cum aliis variorib; è Virginia transmisit.

TAB. LIV.



Tab. xxiii
f. 1. Pentaphyllo Malabaricæ simulis Arbuscula Maderaspatensis (i.e.) Bacifera Indica baccis oblongis in Umbellæ formam dispositis Raÿ Hist.
2. Pulegium virginianū angustifol. (Serpentaria dictum) floseulis in Cymis. an potius Clinopodium Pulegij anguste rigidog. folio virginian floseulis in Cymis. Pulegium virginianum Nonnullis. alijs Serpentaria aut Colubrina virginiana Raÿ Hist. Sabinæ foribus in summitat. dispositis Cat. H. A. I. Pulegio Cervino quodammodo accedens capitata Chamapitys Austriaca cærulea folijs v fauc Breyn. Prodr. 2.
3. Quercus virginiana castaneæ folio, nostra Raÿ Hist. append.
4. Quercus Esculi divisur. a folijs amplioribus aculeatis, an Quercus alba virginiana Park.
5. Quercus virginiana rubris venis marinata The Scarlet Oake, nostratibus dicta. in Horto. Compleniano. hujus plurimas adolescentes Arbores observavimus.

TAB. LV.



Tab. LV.

f. 1. Ranunculus hirsutus annuus floreminimo Raÿ Hist. & Synops. Method. Stirp. Brit.

2. Ranunc. aquatic. albus circinatis tenuissime divisis foliis floris, & alis longis pedunculis innixis Nobis Raÿ Synops. Millefolium aquaticum cornutum quoad figuram I. B. 3. item quoad figuram, ut & dimiphonem C. B. Prod. Millefolium aquaticum cornutum majus Park.

3. Rapunculus spinosus foliis oblongis folio Bisnagarius floribus aurantijs.

4. Reseda Masticutis foliis latioribus crispis. Reseda tripa Gallica Bocconi 77. Reseda latifolia flore flavo Moris. Prælud. Botan.

5. Reseda minor Indica Orient. Staticis nascens pratensis folio, crenis & asperola. s. Sanamoides parvum Bengalense serratum.

6. Rhamnus cassij Myrsinites facie spinosus, foliis densis fere conjugatis. Sarmini floribus & spinis geminatis.

7. Rhamnus Orientalis spinis unijnatis, altero purpureis. Dioscor. 5. Ligustri folio, cujus ad imum pediculus umbilico inarticulatur. Rhamnus Orientalis. Ligustri folio spinis altero-purpureis nostræ Raÿ Hist. an Mahaleb genuinum Arabum?



Tab. LVI.

f. 1. Rhoi Obsonorum similis Americana, summa candidum fundens, non serrata, foliorum rachi medio alata. Rhus virginianum Lentiscus foliis Ray. Hist. Barrel. Tel. Sterp. Virg. Illis haec est Copallifera Arbor. Errandi ansam nonnullis scriptoribus, haec forte praebuit Arbor, quam Lentiscum nostrum Europeam Virginiae plagis indigenam esse contendere belint Vid. Hond. Geograph.

2. Ricinus Indicus pilosus, trifidus, vel quinquefid, flosculis atro purpureis, in Umbella aggregatis. Huapachotl. Huaxacensis. 2. Ricinus Novae Hispaniae Hernandez. Hist. Mexic. an Ricinus Americanus folio Staphisagriae C.B. Pin. app.

3. Euphrasia Alsines angustiori folio. Rubiae modo Spicata. Golondea, herbulam hanc exoticam sub Euphrasiarum breville militari, ab eximio Botanico D. Doody. didicimus, ideoq. male hoc loco collocatur. ad Euphrasias ableganda sit.

4. Saamoüm Pisonis. s. Sihuquiora Brasilianus arbor, digitatis foliis, serratis floribus, flavis purpureis. Arbor pentaphillas virginiana floribus spicatis monopetalis Mus. Courtenian. Ray. Hist. hujus exemplar, cum multis aliis exoticis, ab insigni viro D. Gulielmo Courtene, dono accepimus.

5. Salix longiori folio hirsuta, rosea, nostras.

TAB. LVII.



Tab. LVII.

1. 2. Salvia, foliis ovato-oblongis simplicibus, petiolis insidentibus lanuginosa. an Salvia angustifolia serrata C.B.P. Salvia Cretica angustifolia aurita Park. (id) Salvia tenuifolia I.B. Cret. 3.

2. Salvia Cretica pomifera Clus. Hist. Salvia baccifera C.B.P. Salvia pomifera Cretica I.B. Hist. l. 3. Salvia major Cretica latifolia & angustifolia, aurita & non aurita, pomifera & non pomifera Park. Theatr. huic folia sunt viridia.

3. Salvia angustifolia mucronata foliis crassis lanuginosa appendiculis auctis.

4. Salvia trifoliata minor Indica.

5. Salvia trifolia e Peruviana vice. Bon. Spec. forte Salvia Syriaca folia serrata, foliis acetabuli Moluccæ Breyn. hujus etiam Leonard. Rawolfius. mentum Halepensem.

6. Salvia frutescens humilis haud inane, floribus purpureis. Verbasum arbores florerubro arborescens Cat. Hort. Groningens. Verbasc. sylvest. Salvifolium arbusculum folio rotundiore foliis I.B. Hist. l. 3. Verbasum quercifolium Salvia folio C.B.P. Verbasc. Salvifol. exhibuit Cisteoides Park. et sub Verbasci Cisteoidis nomine ex Horto Cl. Seguierani habuit Caspar Bauhinus. hujus flores Lobelio videntur quam conjugit: et Cisti omnes appingit Parkinsonus. illum pentapetalos esse, petalis subrotundis, colore flavo, staminulis rubentibus, describit. sed hæc omnia phantasmata, nisi minus erronea à Cl. Heermanno in Cat. H. Ac. Lugd. Append. elegantius & minus cognita sparsim. Verbasis latis Salviæ foliis C.B. Synonyma proponitur. Antè triginta circiter annos in Horto D. Morgani luxuriantem observavimus.

7. Sedum alpinum tridactylites, Alpina minus flore albo majore, Sedo Alpino tertio simile, altera Fab. Col. ephr. p. 2. Sedum Alpinum bifido folio C.B.P. Sedum Alpin. lanuginosis Aizoon foliis Park. Sedi affinis trifolia Alpina flore albo I.B. Hist. l. 3.

TAB. LVIII.



Tab. LVIII.

1. Sambucus humilis, s. Ebulus laciniata folio C B P. Ebulus laciniata Ponæ Ital. ā flores b. fructum indicat.
2. Saxifraga myosotis alpina flavib; albicantibus fris Umbellatis. Saniculæ Alpinæ aliquatenus affinis I B. l. 3. Cotyledon hirsuta Phyt. Brit. Ray Hist. et Synops. an Saniculæ montanæ alterius species 2. Clus. Hist.
3. Saxifraga s. Serratula minor canadensis spicata floribus squalide purpureis.
4. Scabiosa peregrina Thapsiæ majoris folio squammatis capitulis flore flavescente.
5. Scabiosa Transylvanica s. Globularia frutex. rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autem mucrone præditis.
6. Scabiosa Tomentosa hyssopifolia s. Globularia capitulis ad geniculos foliis plurimis stellatim ambientibus barbellata. forte Teucrium. Trismall. s. Caput formicæ Hernand. Hist. Mexic.

TAB. LIX.



Tab. LIX.

1. Saxifraga alba folio oblongo mucronato. Saxifraga alba folio oblongo acuminato 5. Banist. Cat. Mss.

2. Sihath Nori Malab. & Madera-pâtan Jasminum Indicum, Curi folio incolorum, umbellatum, floribus Cassiæ PBP. Jasmin. arborens. Indic. flore tetrapetalo, limbellato, pharnaceo, foliis Laurinis. Breyn. Prod. 2. Ratambala Zeylanensium.

3. Scorpioides Bunonaria folio singulari rigido, siliquis articulatis, seriatis. Onobrychis Zeylanica folio singulari, oblongo rotundo. D. Herculano. D. Sherrard.

4. Scorzonera bulbosa, tortuosa minimæ foliis Graminea.

5. Sirophularia, scrodoniæ foliis Horti. Hist. 2. & Prælud. Bot. Rajj Hist. & Synops. Lessnia nostra Anglicè adjacentis Insulæ indigena esse à D. Sherard. nuperrime observata.

6. Serpyllaria Madraspatana, siliquis falcatis, fulvis, & villosis, plurimis circa summales stellatim positis. Stella Orientalis fulgens. a. siliquam secuit. b. semina demonstrant.



Tab LX.

1. Sena exigua Maderaspatana s. Tetraphylla siliquifera glabra, florum pedunculis inter foliorum exortum dispositis. an Absus Varlingÿ. Obs. in Alpin. Senna Oriental. Tetraphylla Absus dicta ap. Hort. Ac. Lugd. Stemmatis colore splendidum, parvis insidet siliquis Cicerum aemulis, dextrorsum leviter bicornes, à semina rhomboide flavo ostendit.

2. Sena tetraphylla s. Absus congener hirsuta, è Madraspatana, flore flavo, siliquis punctatis scabris, folliculos sub terram condens. b. folliculum c. nudatum, d. folliculo resumto, siliquam cum seminibus Pyri proximis ostendens. an Arachidna Indica rubriore, tetraphylla. P.B.P. Mandubi Pisonis.

3. Smaio pusillus Madraspatanus foliis ternatis, crassis, & hirsutis. Planpanzi-huitl Nov. Hisp. Rheed. huic haud prorsus dissimilis.

4. Senna platycarpa foliis denuis pilis pubescentibus.

5. Sinapistrum Indicum diphyllon, radicalis siliquis ad sinus foliorum ex adverso binis, ad hujus Sinapistri genus accensiri debent. Cupa-Veela. & Aria Veela Hort. Malab. p. 9. ut nobis videtur.

TAB. LXI.



Tab. LXI.

1. *Sisyrinchium coeruleum parvum gladiato caule Virginian. ſ. gladiol. coeruleus hex apetalos caule etiam gladiato* Banist. Cat. Mſs.
2. *Sisyrinchium Bermudense floribꝰ parvis ex cæruleo & aurto mixtis Iris Phalangoides quorundam.*
3. *Sium minimum umbellatum foliis bariis Sium minimum* Ray Hist. *Sium minimum ſrulacris foliis* Moris. Prælud.
4. *Soldæ Malabaricæ ſimilis Arbor Maderaspatana eucammis donata.*
5. *Sonchus subrotundo folio noſtras. laciſſimus ſpinulis cir ca foliorum oras exasperatus. an Sonchus asper subrotundo folio* C.B.P. Park. *Sonchus asper bulgs. flore Hieracij Monspelimis*, Ray. Hist. *Monspelij ſponte naſcitur. ut in Anglia.*



Tab. LXII.

f. 1. Solanum insanum Chinense minus spinosum, floribus parvis, ferè umbellatis à D. Pottevin accepi.

2. Solanum Indic. spinos. atro virens, undiq; glabrum, foliis Brancæ Ursinæ divisuris, an Solan. pomiferum spinos. Indic. fructu echinato foliis Cardui? Acanthi spinosi Bonn. Acad. 1. in Horto quodam Hollandiæ celebri vi collegit D. London, & nobis transmisit.

3. Solan. annuum nigricans Virginianum spinosissimè sese spargens, flore cæruleo glabrum. Planta spinosiss. Virginiana Borraginis flore. Tradescantio Rāy Hist. 674. & in app. 1876. item Solanum pomiferum fructus. African spinos. nigricans Borraginis flore, foliis minus profundè laciniatis, spinis multò longioribus, majoribq; & validioribus horridum Rāy Hist. 799. an Solan. American. laciniatum spinosiss. P. B. P.

4. Sonchus ἀφυλλόκαυλος angusto & oblongo folio nostras, per foliorum ambitum creberrimis spinulis asperatus.

5. Sonchus angustifolius maritimus CB. Pin. & in Prodr.

TAB. LXIII.



Tab. LXIII.

1. Solano ab pedun. Morsui Porcinum affinis lanuginosa Basella scandens Cochin-Chinensis, flosculis purpureis, muricatis spicatis, fructu intus cochleato. Solanum racemosum Malaburic. Beta folio Commelin. Hort. Amst. Solanum procurrin. Betaefolia Ray. Hist. Beta baccifera arzoides rotundi folia Cynapium Brevyn. Prodr. 2. Basella Zanon. Basella Hort. Malab. P. 7. ubi sub Bryonia genere (minus apte) recensetur. Vellet Commelin. in Not. supra loc. Birtal. Tuplanensis, v. Cochin-Chinensibus Bretho-Condolio nominatur. sucessive floribus (non a fructibus ut bulbi Annotator) ex pressus commodissime pro miniatura a illustr. in Hortu Compteniano apud Fulhamenses cum floribus & fructu collegimus.

2. Spiræa Tiliæ folio asti similis Frutex Indicus latiori folio, spicis florum & foliorum aliis, hujus ramulum noster amicus Reverend. D. Dodsworth in horto cujusdam ingeniosi Viri D. Wilkinson Pharmacopœi Eboracensis collectum & optime rejiccatum absq; titulo nobis Londino transmisit. v. forte Evonymi nostræ Lusitanicæ folijs Carolinensi varietas haberi possit. an Frutex Virginianus floribus albis visitur Spiræa compactis Cat. Ills. Hort. Oxon. lita significat flosculos per Mieroscopium bifidos in perianthijs occlusos & nondum explicatos.

3. Sphondylium hirsutum minus folijs tenuiter laciniatis seminelato. Sphondyl. mont. min. angustifol. tenuiter laciniat. nostrum Ray. Synops. an Sphondylium Alpinum parvum CB. pin. & prodi.

4. Staphylodendron Æthiopic. Μοναδελφοκαλλιγονοφυλλον. singulari hirsuto folio nitente. Staphylod. Afric. semperviren folijs splendentib, Commel. Hort. Amst. Staphylod. Afric. folio lucido P.B.P.

TAB. LXIV.



Tab. LXIV.

1. *Stachys angustifolia, Lychnitis non serrata. Stachys Cretica C. B. P. Stach. 5. Pseudo Stachys Cretica Park.*
2. *Stachys Lychnitis angustifolia serrata. Madrastpatana, lit a. imum folium cum ejus pediculo oblongo significat.*
3. *Syringa Laurifolia Jamaicensis floribus ex flavo-pallescentibus, his sortiuntur Tolomea palli Mexicanis, Syringa lutea Hernand. Hist. Mexic.*
4. *Tamarindi Americanus siliquâ fere orbiculatâ monospermos Mus. Tournef. Tamarindi Occidentalis siliquâ subrotundâ. Carandas forte Bontio Raij Hist.*
5. *Tamarindus Bimagaricus siliquâ productiore dispermos seminibus, debuli isthmo interceptis ex semina siliquis ejecta donotant.*
6. *Terebinth. minoris amula foliis angustioribus, & rotundioribus. Arbuscula Bimagarica.*
7. *Teurii facie Bimagarica tetragonis rostrata pilis scatens foliis profundè bimeris.*

TAB. LXV.



Tab. LXV.

1. *Teucrium luridum parvo folio flore denule purpureo. Chamædrys Alpina lurida* Cal. H. R. P. *Chamædrys Alpina latifolia elatior splendens* Sch. Bot. *Teucrium African. fruticans folio viridi splendido* D. Magnol. Hus. Sourkea.
2. *Teucrium Alterum molli lanugine incanum. an Teucrium creticum* Clus. Hist. Park. *Teucrium Creticum incanum* C.B.P. *forte cham Scordium lanugi- nosum ejusd* C.B.P. *Scordium lanuginos. Creticum Sancte munificentiæ D. Wheeler acceptimus.*
3. *Thalictrum pratense majus Monspeliensium folio rugoso* Cal. H. R. P.
4. *Thalictrum tuberosum sordidi. Gaspare Bauhino* C.B. Hist. Park.
5. *Thalictrum minus luteum Granothis Coronariæ folio an Thalictr. folys luteo. Rorismarini instar quorundam.*
6. *Thalictr. angustis folio* Park. *Thalictr. pratense angustis folio* C.B.P. *quod prim. in Peedi*
7. *Thapsia latifolia Hispanica* Park. *Thaps. 8. Clusii latifolia flore luteo, semine lato simili Secali. Peloponensis Lobelio* I.B. Hist. l. 3.
8. *Tithymalus 5. Chamæpyce altera breviorum folys ovatis & macula fusca elegantèr notatis, nostr.* Raij Hist. Commelin. Hort. Amst. triginta abhinc ad minimum annis in Horto D. Walker *olim vigebat.*

TAB. LXVI.



Tab. LXVI

1. Thapsia [illegible] Seseli Peloponense folia Cicutæ Adv. & Icon. Lob.
2. Thapsia [illegible] B. Hist. I.
3. Thaps. latifol. Bulbosa C. B. P. Seseli Peloponens. majus Lob. Ic. Thapsia querund. hirsuta & aspera. Cicutæ folio. flore luteo. semine lato. alys Seseli Peloponesiacum I B. Hist
4. Thapsia glutinosa Pimpinellæ Saxifragæ foliis benoris. ex Hispaniâ Thapsia 4.ª s. Tuero. dicta Clus. Hist. Thapsia 4.ª Clusy. Tuero. hirsuta foliis glutinosis radice nigrâ foris I B. Hist. I. 3. Thapsia foliis Libanotidis fœtidissima C. B. P. item Cicutaria latifolia fœtidissima altera Phytopin.
5. Thapsia Carotæ facie I B Hist. Thapsia Carotæfolio C. B. P. Thaps. bulgaris Carotæ effigie Adv. & Ic. Lob. lit. a. hujus umbellam seminibus onustam indicat.

TAB. LXVII.



Tab. LXVII.

1. *Thapsia maxima folijs quadrijugis, segmentis denticulatis & adversis sitis Thapsia Salmanticensis s. f. Clusij. magna. flore albo semine lato I B. Hist. 3. p. Thapsia maxima Hispanica Park. Thapsia maxima latissimo folio C B P.*

2. *Thapsia Creticæ folio altissima glabra. Thapsia Theophrasti folio Bot. Monsp. Thapsia s. Turbith Garganicum. semine latissimo I b Hist. 3. p. Silaus à quibusdam Umbella.*

3. *Thymelæa Apuliana glabra floribus rubentibus nostra Ray. Hist. app. ad Sonamunda 4as folijs glabris acutis Breyn. Fascic.*

4. *Tribulus terrestris Americanus Anemones flore flavo. Tribulus terrestris major Curassavus, P. B. P. Tribul. terrestris Ambros. Chamæcisti flora. fructu spinoso maximo Dioscoridi Lib. 4. cap. 28. a fructum denotat. ab Insigni Botanico D. Tancred Robinson accepimus, qui in Hortis Batavis collegit, sed absque mare.*

5. *Cytisum purpureum Cretæ Cytisi dictum. Lotæ affinis folio & facie Pentaphylloides frutescit nostratis floribus in spicam longiorem dispositis. Cytisus Cretinus κρηνοῦσιλλον Honor. Belli.*



Tab. LXVIII.

1. Trifolium siliquis Leto affine, siliquis Ornithopodij. Trifolium siliquis Ornithopodij nostras Raÿ Synops. & Hist.

2. Trifolium pediculis foliorum longissimus Bisnagaricum, forte Trifolij Bituminosi genus Indiæ Orientalis.

3. Tulipifera Caroliniana foliis producioribus magis angulosis Mus. Comiten. forte Macpalxochia-Quahuitl Mexicensibus Hernandez. Hist. lit. a. florem expansum indicitat.

4. Tulipifera virginiana Laurinis foliis aversa parte rore cæruleo tinctis. Conibaccifera. Laurus Tulipifera baccis rubellis Cono evesso inclusis. Banist. Cat. Laurus Tulipifera foliis subtus ex cinereo aut argentro purpurantibus Raÿ Hist. lit. b. baccas Cono capsulato per tenue filamentum appensas ostendit.

TAB. LXIX.



Tab. LXIX

1. [illegible] cumilum Bimagaritum argenteo nitore serisseum capitulis oblongis hispidis.
2. Trifolium Americanum Vialius holosericeum summo folio bifido suaveolens. Melotis genus (forte) Indicum.
3. Vitis Idaea spinis Maderaspatana Nerum forte Malabar ensibus dicta Hort. Mal. P. 2. an Frutex Indicus baccifer Vitis Idaea [illegible] Burm. Zeyl. Brown Jam.
4. Vitis Idaea Bengalensis Uva Ursi bacca singulari ad foliorum exortum barbulis donata.
5. Volubilis Ganetica sapore acri aromatico. Clarius autem Aristolochia Clematitis Ganetica foliis in acutum abeuntibus radice odoratissima.
   Aristolochia Clematitis Indica odorata P. B. P. Addend. Carolo-Vango Hort. Malab. Sajanda Zeylanensib.
6. Volubilis Aristolochia Clematitis Bimagarica spinis asmollis aculeata.
7. [illegible] louka Malabaricae haud multum dispar. Frutex aculeatus? Maderaspatan Hort. Mal. P. 4.

TAB. LXX.



Fig. 2.

Fig. 1.

LXX.

1. Verbena Scutellariæ. Scapida folio dissecto. Americana. an Verbena Indica Bonty. Hist. Ind. Or. fortè etiam Verbena Curassavica Scutellariæ folys. flore purpurascente P. B. P.

2. Veronica Virginiana procerior. foliis tenuis. quaternis. & etiam quinis caulem amplexantibus. spicis florum candidissimis. an Veronica Americana erecta. frutescens. & ramosa folio Verbenæ P. B. P.

TAB. LXXI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Tab. LXXI.

1. Vicia multiflora maxima pericarpis teres odoratis floribus albentibus, lineis cæruleis striatis. Vicia Sylvatica multiflora maxima Phytol. Brit. Raÿ. Synops. & Hist. Vicia perennis multiflora spicata major. floribus albis, lineis cæruleis notatis. Moris. Hist. 2.

2. Vicia Lathyroides nostras. i. Lathyrus Vicia formis Raÿ Hist. & Synops. Lathyrus ex cæruleo & rubro mixtus Morvel. Pin.

TAB. LXXII



Fig. 1.

Fig. 2.

Tab. LXXII.

1. Vicia multiflora major angustifolia glabra, seminibus oblongis albo v. cæruleo mixtis. an Vicia Onobrychidis flore C. B. P. forte Vicia maritima multiflora alba Mezoneusis Ray Hist. v. Cat. Exter. fortasse an Aracus minor Lusitanicus Park. Legumen pallidii Ulyssipponense Nony. Braudony. Gen. emde dpp

2. Vicia multiflora Cassubica frutescens lentis siliqua Breyn. Prodr. 1. Cat. Hort. Ac. Lugd.

TAB. LXXIII.



Tab. LXXIII.

f. 1. *Absinthium Ponticum, repens vel supinum* C.B.P. *Absinthii Ponticum supinum Herbariorum* Obs. Lob. *Absinth. repens* Tab. Icon.

2. *Absinth. Halepense, minus, album, grabo dens, coma delicatiori. Absinth. Scordonium Arabum* D. Bobart. *sortis, Schisha Arabum, Absinthij genus tricæ Bethlehem* Raw. Pro. Hist. Lugd. App. *Hæc pulcherrima Absinthij species, cum plurimis aliis novis & illustrioribus Plantis quas summa diligentia ex indefessa peregrinatione suâ per totam fere Europam sibi acquisivit Ornatissimus vir, & hujus Botanices Stirpis Hortus Ornamentum D. Guilielmus Sherard, nos ditavit.*

3. *Acacia spinosa foliolis perexiguis, & vel crispatis Madraspatana sortis, fructu, foliis Acaciæ Mesopotamiæ,* Fab. Col. Nol. in Ecphr. *Acacia similis Mesopotamicæ minutissimis foliis, siliquâ integrâ contorta, crassa, & obtusa.* 2. *Siliqua Nabathæa* Breyn. Prodr. 2.

4. *Acacia affinis Virginianæ spinosæ, siliquâ membranaceâ planâ, floribus albis papilionaceis. Anagyris odorata modo in Usum propendentibus. Acacia Virginiana siliquis glabris* Ray Hist. *Arbor siliquas Virginicas spinosas. Genus Nostratibus dictæ Park. Anagyris Americ. spinosa floribus albis odoratis* P.B. *Pilosum. Laburnum odoratum. Cytisus foliis Cobitidis apud* P.B.P. *Laburnum spinosum Mauritanicum foliis Glycyrrhizæ, flore albo* Breyn. Prodr. 1. *Glycyrrhiza Labrusca rimosa. Glycyrrhiza affinis spinosa, e Boreali orientalis Mauritanica. Laburnus siliquosa, cujus semen indigitat.*

5. *Adianthum Æthiopicum, Rutæ muriariæ simulans, pinnulis oblongis, magis & acuminatis, triquetris* D. Petiver. *habuimus.*

6. *Adianth. maximum, segmentis rotundioribus* Sch. Bol. *Adiantho-marathrum* Tab. Ic. C.B.P. *vix plane hujus, quid sit hoc Adianthi genus, adhuc nondum aliquis scivit. Anglicæ nostræ adjacentis insulæ alumna est, ut eandidè nos monuit D. Sherard.*

7. *Alcea an Malva potius sit altera. Protophyllis subrotundis, rectis, purpureis floribus sine pedunculis.*

TAB. LXXIV.



Tab. LXXIV.

1. Alsine Indica frutescens ... Alsi... ...onica folio Laurino. flore pleno carneo, in medio roseo. Cl. Breyn. Prodr. 2. Sanguinaria Iapon. ...

2. Alsine Saxifraga Graminifolia. floribus tetrapetalis hirsutis & muscosis. an Saxifraga Anglica annua Alsines folio D. Plot. Ray Hist. forte etiam Saxifraga graminea pusilla, folijs brevioribus & strictioribus, floribus albis. Saxifraga annua Anglica nostras a D. Lawson. descr.

3. Alsine Polygonoides folijs tenuissimis per geniculata bina ad summum caulium polyanthos. Alsine Nodosa multiflora, Sch. Bot. Anunquam satis laudato Viro D. Sherard habuimus.

4. Alsine palustris repens folijs lanceolatis, floribus albis parvis exiguis. Alsine palustris exigua folijs lanceolatis. Plantaginellæ aquaticæ instar, floculis albis bis conspicuis Menth. pugil. Plantago aquat. minim. Clus. Hist. Park. Plantaginella palustris C. B. P.

5. Alsine aquatica major repens, folijs acuminatis. Virginiana.

6. Althæa Indica Abutilis subrotundo folio, flore luteo spicato, forte Malva Americ. Abutili folio, flore luteo spicato, folijs incanis P. B. P.

7. Althæa Scammony folio, floculis albis Zeylanica P. B. P. Nilavonanghus Wissadulu Zeylanensib; dicta in Hort. Regio. Hamptonians. longe celeberrimo, conspeximus, & in Horto Comptoniano collegimus.

8. Althæa Americana frutescens Melochiæ folijs anguste oris; an Malva frutex. Melochiæ angusto folio florib; albis fasciculatim congestis P. B. P. inter. Addend. an Spec. Uren. Hort. Malab. P. 9.

TAB. LXXV.



Tab LXXV.

1. 1. *Alsine montana capillaceo folio C B P Park. an Alpina Saxifraga angustifolia minima montana Col. ecphr. quae parum differt ab Alsine tenui foliâ muscosâ ejusd C B P.*

2. *Alsine Caryophylloides angustifolia, multiflora, glabra, purpurascens, radice Astragali, an Caryophyllus sylvestris graminis multiflorus C. B. P. ait fortassis an Caryophyllus Saxatilis foliis graminis ejusdem bellatis corymbis ejusd C. B. P. (i.e) Symphytum petraeum. Gypsophylon majus Thely. Harry.*

3. *Alsine Polygonoides tenuifolia, fasciculis ad longitudinem caulis deliquescentibus in spicam dispositis nostra. Ray Synops. Polygonum angustissimo gramineo folio erectum. Bot. Monsp. in Maritimis circa Bostoniam agri Lincolniae.*

4. *Alsine Polygonoides herbacea minor, foliis capillaceis ex une pediculo plurimis. à D. Sherard. habui.*

5. *Alsine Alpina glabra, sobolis rossaeis. an Saxifraga Bavarica Park. ejusd D. Sherard. humanitate accepi.*

6. *Alsine Spergulae facie Ingalmis, foliis angustis ad genicula binis, floseculis autem plurimis, ad caulem radiatis, seminis minutissimo fulvo.*

7. *Alsine Americana Nummularia foliis Parad. Baldy. Prodr. ab eodem D. Sherard. communicata.*

8. *Amaranthus Indicus tertius flatus albus Origani foliis sanguine incanis. an Amaranth. Alopecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio Breyn. Prod. 1. sexto elis arm. Amaranthoides humile Gui pipericum foliis Polygoni Par. Bat. Fr. in Hort. Reg. Hamptonc. observavimus*

9. *Amaranthoides humile Curassavicum foliis Cepaea lucidis capitulis albis PBP. Amaranthus affinis atriplicis 1. Amaranthoides minor Americana procumbens, Sedi tenuifolii foliis, facie flore oblongo nivco. Breyn. Prod. 2. Trifolij spica Arithmum maritimum non spinosum Brasiliense Ray. Hist. Pernambuc. do Mar. Lusitanis. 1. Laeponga 1. Brasilianis Pison. Hist.*

TAB. LXXVI.

Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 6.

Tab. LXXVII.

1. Apocynum Americanum erectum tuberosa radice non incanum foliis rigidioribus latis subrotundis floribus albis intus purpureis summo caule corymbum magnum efformantibus an Apocyn. Americ. arborescens foliis rigidis, subrotundis, amplissimis. P. B. P. forte Apocynum erectum non nimium incanum latiore folio, Umbellis florum albicantibus. Banister. Cat. Skirp. Virg.
2. Arbor Americana, Morifolia. baccule seminales barbute solem emule. ovate. Balsamum olente. Cedrus spuria Jamaicensib; nostratibus dicta.
3. Arbor Drumbalis Bellidis spinosis sohdioribus foliis capsulis sparsis quadrigeminis. Kiluka Cingalensib; distabuja Spinum asininum Indicum Bellonio. Tanarind. Robinson. dobmus.
4. Arbor Americana trifolia fructu Platani quodammodo amulante. Lignum fibularium (vel) Bullenwood. Nostratib; dicta.
5. Arum trifolium minus pengatro rubente Virginianum. Aristarum trifolium minus pene atro rubente Banister.
6. Arum Moschatum Ophioglossoid. s. penudo Jamaicense. an melius Ophioglossum Moschatum Jamaicense Limonij folijs in extremo Sinuatis. an Aristarum fluitans pene nudo Virginianum. Banist. Cat. Mss.

TAB. LXXVII.



Tab LXXVII.

1. Angelica Charibbæarum elatior. Oluatri folia flore albo. seminib. striatis. Lumini odore & sapore.
2. Anthusa repens Lithospermi facie floribus cæruleis secundùm folia prorumpentibus. Lithospermum hirsutum Thalÿ. Hareyn. Lithosp. maj. repens latifolium C.B.P. Lithosp. majus Dodonæi fl. purpur. semine Anchusæ I.B. Hist. t. 3. l. 33. p. 592. ubi Icon minus feliciter exsculpta ac verosim. ad pag. 692. transpetita est.
3. Anchusa dilleniensis foetidula Orientalis herba quadricapsularis.
4. Anonis purpurea procumbens perenne. s. præcox. frutescens annua. bistosa. siliquis crassis, lentiformibus, varius dispositis floris. Hist. 2. forte Anonis Hispanica frutescens folio Ciceris sylvestris triphylli Sch. Bot. Anonis annua variosa. foliis rotundis serratis Cat. Hort. Edinburg.
5. Apocynum hirsutum scandens Americanum flore amplo purpureo. an Apocynum scandens Africanum hirsutum P.B.P. Spectatissimi Viri D. Fosteri Horto plurimarum Plantarum ex oris earum instructissimo, ambabus ad Austrum sitis formam bidimuus habuimus.
6. Apocynum Curassavicum fibrosa radice floribus aurantiis. hamaenurij foliis angustioribus P.B.P. an Apocyn. erect. minimum angustif. Americ. flore umbellato. aurantio. petalis reflexis Hareyn Prod. 2. sed nectaria florum petala non reflexa sunt, sed potius in fistulam ut ita dispositus flosculum concavum efformant.

TAB. LXXVIII.



Tab LXXVIII.

1. Aristolochia polyrrhizos auriculatis foliis Virginiana. forte Polyrrhizos Virginiana Park Serpentaria altera Virginiana vulgo
2. Agarum Virginianum Pistolochiæ foliis subrotundis Cyclaminum more maculatis. Agarum Cyclaminis folio Virginiana. Bauh. Pin. 181.
3. Asparagus denudatus triplici spina Prom. Bon. Spec. an Asparagus sylvestris spinosa Africana Cat. Hort. Angel. alibi in Hort. Kemp. Kempferus
4. Aster hirsutus Cubitalis. virgatus foliis summo caule amplexis floribus amplis. in Herba Vulneraria. ad fluvium Pfrim. Hieronym. Tragi. Conyza affinis Germanica C. B. P. Consolida Saracenica 1a Tragi. Hist. Lugd. Conyzis affinis. Herba Vulneraria, s. Solidago Saracenica 3a Tragi hirsuta I. B. Hist. l. 2. hujus exemplar nobis amicissimè donavit D. Doody. qui ipse inter Siccatas exoticas & quamplurimas varietates Plantas, in Horto Potavino jamdudum collectas, in Chartis asservatas, quas sibi impetravit abs. q. titulo invenit.
5. Aster Americanus Bellidis foliis floribus ex cæruleo albicantibus. spinis longioribus. in Aster Novi Anglia Tripolii floribus spinis longis diuturnis C. B. P.
6. Aster American; multiflorus, flore albo Bellidis, disco lutro Dnus de Fliner. Sch. Bot.

TAB. LXXIX.



Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Tab. LXXIX.

1. Aster Americanus albus latifolius caule ad summum brachiato, si color florum & foliorum conjugata positio non observetur huic [illegible] Phlox chalcidi Nov. Hisp. Recch. eandem plantam ejusque picturam refert.
2. Aster Americanus albus Mauri et Arabum ex asperatis foliis florum petalis reflexis.
3. Astragalus annuus foliis & siliquis hirsutis, plurimis in foliorum alis sessilibus. Astrag. siliquosus hirsutis floribus parvis Morif. Hist. 2. Sect. 3. Graeco sylvestri Tragio quibusdam accedens Planta I. B. Hist. l. 2. Astragalus marinus Bonellus Park. Vitis Sarracenica Apula Col. ecphr.
4. Astragalus hirsutus cornutissimus plurimis uno pediculo stellatim formiter adaptis. Ornithopodio affinis hirsuta fructus stellato C. B. P. Stella leguminosa C. B. Hist. l. 2. nimis elegantissimi Viri D. Patricij Adair aliquamdiu
5. Astragalus Pyrenaicus inermis foliis Pisi, flore Sulphureo. Pluk. Bot.
6. Aurisula Ursi Virginiana floribus albis Borraginis initio reflexis, stylorumque more reflexis. à Celeberrimo Botanico D. Banister in Anglia nuperrime detecta.

TAB. LXXX.



Tab. LXXX.

1. 1. Balsamum Caparium Antegoanum v. Novisense fœtidum. 2. Arbuscula Americana Balloteolmo, Scammonio foliis pendulis, superiùs longiùs pedunculis, floribus parvis pentapetalis spicatis.
2. Brassica spuria caulis non laumatas, caule magis foliosa hirsutior, foliis subrotundis. Brassica spuria minima, caule magis foliosa hirsutior nostra. RAY. Synops. app.
3. Brunella Hyssopifolia C. B. P. Brunella minor folio rigido, integriore, d. Phytop. Prunella angustifol. IB.
4. Buguloides (Fenatelo mentoria Scania, seminibus albis, minoris dotis sive Divini Orbi Pradicatoris apud Londinenses Reverendiss. D. G. Stenestroed. primo novum hoc Bugulæ genus accepimus.
5. Buxus Africana rotundifolia serrata P. B. Pin. Horto Regio Hamptoniensi collegimus.
6. Buxus Laurifolia angustiore folio, accedens Americana.
7. Cardiaca minor annua Americana flore argenteo. Lonicera Americana alba folio sideritidis longioris, 2 seminibus natans, superiori omnium in Horto Hamptoniano observavimus.

TAB. LXXXI.



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 4.

Tab. LXXXI.

f. 1. Cassia lignea Jamaicensis cortice arti candicante. Canella alba Cluy. Laurifolia Magellanica cortice atri C.B.P. Cortex Winteranus ater, s. Canella alba I.B. an Ligni aromatici Monardi cortex.

2. Cardus Tingitanus, flore magno, cæruleo, folio Altractylidis divisuræ subtilissimæ, sine spinis durioribus horrido.

3. Caryophyllus sylvestris Alsines holosteæ vernis glabra, foliis flaccidis unico. Calyce barbato. Armeria spontiflora summo caule singulari nostra Raij. Synops. app. forte Caryophyllus sylvestr. humilis flore unico C.B.P. an Lychnis Massaniensis parvo flore rubello, & calyce oblongo angusto Raij. Cat. Exterar.

4. Centaurium cilhare minus. Bisnagarium. Drigani foliis amplioribus, floribus in Umbellis.

5. Chamædryfolia, Scandens clausulata & Corymbifera Jamaicensis. hùc forte pertinet Bryoniodes. s. Tamnoides-Yautiopoensis Mexicensibus Hernand.

TAB. LXXXII.



Tab. LXXXII.
f. 1. Baliş montana minor Tanaceti foliş Morıs. Prælud. Tanacetum montan. inodorū. minoris flore C.B.P. Tanacetum album I.B. Hist.
Tanacetum inodorum secund. Clus. Hist.
2. Centaurium Cilvare minus, Circææ foliis firmioribus spicatis floribus è Maderaspatan.
3. Ceratia diphyllos Antegoana Rivini majoris fructu oblongo siliquâ grandi inclusa. Arbor siliquosa ex Virginia dobo fustos cabo e. C.B.P. ultim. Arbor siliquosa ex quâ Gummi Anime exilit, ejusd. C.B.P. Icaiba arbor Gummi Anime fundens Pison. Manica quo dammodò accedens, Arbor Anime Gummi fundens Americana, foliis magnis, acuminatis in pediculo binis. Lobo magne crassissima eduli Brayn. Prodr. 2. Animifera arbor Brasiliana P.B.P. hujus siliqua est Lobus ille ex Wigandi arbore de quo Clusius. in exot. Locus Nostratibus bulgo. a a. Lobum bb. bb. fructum indicum
4. Ceratia quedamodo affinis Bengalensis, foliis bigemellis, subrotundis, siliquis admodum inlortis, in orbem circumflexis, ex minio nigricantibus fructu [illegible] maulánagrá insignito. an Abarame-Teme Brasiliensibus Piso? a. siliquam b. fructum indigitant. in Horto Complemanno nutritam vidimus.

TAB. LXXXIII.



Tab. LXXXIII.

f. 1. Chrysanthemum minus Alpinum elegans flore magno albicante foliis crassis, Saxifragia chelidonii radice dentib. hirsutis elegans planta Lugdun. Themo Corymbifero Africano Tritumfalis quoad folia optime convenit, à D. Parry, ad ex stupendam accepimus.

2. Chrysanth. Ordinarium foliis impressis scabris, Madr. anadonum florum pedalis quinis tetragonis, ex calyce amplo binis fistulosis.

3. Chrysanth. angustifolium Plantaginis folijs Virginianum. Doronicum maximum. American. latissim. angulosis fol. radice binis parmis. Cat. H. Ac. Lugd. an Chrysanthemum latifol. Arabicum C.B. prodr. forte Aquatica quadrilatera Hernandis.

4. Chrysanth. Virginian. villosum. Ederae lutea petalis quinis ex pluto. Chrysanthem. pentapetalon villoso caule Banist. Cat. Mss.

5. Chrysanth. hirsutum Virginian. auriculato Dulcamarae folio pentapetalon. Chrysanth. folio oblongo auriculato Banist. Cat. Mss.

6. Cistus humilis. Chamaecistus Ericae folio haltus y elatior C. B. P. Helianthemum tenuifol. glabrum flore luteo I. B. Hist. L. 2. Chamaecistus Ericae folio Park. Cornu simillimus. Frutex in maritimis Andr. Caesalp.

TAB. LXXXIV.



Tab. LXXXIV.

1. Chrysanth. Alpin. Bellidis folio caule singulari. Chrysanth. parvum, s. Bellis lutea parva latifolia I. B. Hist. 3. 7. Chrys. Alpestre Bellidis folio C. B. H. Pin. 2. Tourn.
2. Chrysanth. Alpinum Bellidis folio radiosum.
3. Chrysanth. Americ. hidens alatum flore parvo aurantiaco. Chrys. compositis alato caule Curassavicum P. B. P. Chrys. cannabinum American. alatum, flore aphyllo, glabro, aurantio, foliis Basilicis. Breyn. Prodrom. 2.
4. Cistus Helianthemos, fruticis brevioribus foliis, thuriferus. C. B. P.
5. Cistus Alpinus hirsutus foliis Thymi minutissimis.
6. Cist. humilis Matricariæ camphoratæ tenuissimis foliis glabris Chamæcist. Matthiolo. Corruda vel Coridis lutea folio Schol. Bot. hanc laudem asseruntem injuriosa folia tenuissima Camphoratæ tumbens, glabra quam Celeberrimus noster R. Ahu curta Massiliam invenit, ab ornatissimo Botanico D. Shevard. merito consulur.
7. Clematis Alpina Gerardi folia C. B. P. & Prodr. Clematis cruciata Alpina Ponæ Descript. Montis Baldi.
8. Clinopodium minus ecchium Thymi folio magno. Clinopod. Gesnerum Pr. Alpin. Thymum ecchium flosculis nunquam expansis D. Bobart.
9. Conferva gemiculata minima nostras. Oculatissimus D. Shevard. hanc esse Umbelliferam aliquando suspicabatur.

TAB. LXXXV.



Tab. LXXXV.
1. Chinopodium minus crectum, Thymi folio minore. Chinopodium Thymi folio vulgare Sibbald. Botan. Hars. 59. plantas novissime recensitas, a D. Sherard accepimus.
2. Chinopodium Amaranthi folio, flore albo Americanum Distamni ribi bo calum.
3. Convolvulus Scammonia dictus mihi Wheleri, ab Inventore habui.
4. Convolvulus Scammonia dictus mihi Wheleri, an Scammonea matrorhizos Pr. Alp. exot. Scammonea matrorhizos. Cretica Park. hanc enim ibi se jam videmini Monte suo D. Edvard Morgan.
5. Cucumis parvus repens Virginianus fructu minimo Banist. Cat. M. Cf. fructum d d. semina denotant.
6. Lupinus Virginiana folio Acaciae cornigerae pariter & deciduis. Lupinus Virginianus folio Acinis mollibus, atq; deciduis Breyn. Pr. 2. Lupinus Americana Park. Flos Jani? Lupinus Americanus flore Hahnand. ab Hahni. Pod. Dni cujus fructuris formam Cl. Petiverus sequenti anno amplitudinem ac hujus mechaudmultum abludit, ut rite notat Cl. Raius ob locum inter Natalis distantiam sandrm non auctum. Cl. Petiv. mox citato. a. a. hujus autem integram & diversimode dissectam. b b. nucleos ostendunt.

TAB. LXXXVI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 8.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.



Fig. 6.

1. Tussilago foliis viridib., angustis quam complicatis Monspelienſium C.B.P.
2. Cytisus procumbens Americanus fl. luteo ramosissimus, qui suppeditat apud Barbadenſium colonos Chama-Indigo sylv. trifolia Barbadensib., antisyphiliticus humilis procumbens P.B.P.
3. Doronicis affinis longifolia Ray Hyst. Tussilago Alpina folio longo C.B. Hist. l. 7. Tussilago Alpina folio oblongo C.B.P. Doronicum Pyrenaicum, Persicæ foliis glabrum Schol. Bolan. ubi pro non destript. ponitur.
4. Elatine foliis oblongis serratis ad apicem acres flore Maderaspatana.
5. Eliochryso affinis Orientalis foliolis ad geniculos binis, flore pentapetaloide argenteo apicibus aureis palescente.
6. Eliochryso affinis Orientalis ramosior foliolis caulium nodos radialim ambientib., Coma palescente, flore albo liturâ aurea striato.
7. Erucæ silvestris minor lutea Bursæ pastoris folio C.B.P. Eruca pumila Bursæ pastoris folio Boccon. Eruca Monensis laciniata lutea Ray Hist.
8. Eruca Virginiana Bellidis majoris folio Morif. Hist.

TAB. L XXXVII.



Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 1.

Tab. L XXXVII.

1. Eupatoria compositis Verbasci folia. 2. Baccharis Americana suaveolens. Cardrylon (ie) Sweetwood Barbadensibus dicta.

2. Eupatoria conyzoid. odorata folio crenato, molli subtus cano. Serratula Novoboracensis, folio leviter crenato, molli subtus cano P.B.P. forte Serratula Indica major latifolia mollis Breyn. Prod. 2. Yasteu Serratula affinis capitulis Baccharidis foliis Trachelij Zeylanica ejusd. Prod. 2. Cattu-Schiragam Hort. Malab. P. 2. fere (et forsan Conyza Syriaca Rauwolfy. Hist. Lugd. App.

3. Eupatorium Americanum, Malvæ folijs magis acuminatis. an Eupatorium Novæ Angliæ Stachidis s. Betonicæ foliis crenatis floribus albis P.B.P. forte etiam Eupatorium Americanum, Nepetæ foliis foliorum cymbis albis bracteis. Breyn. Prod. 2.

4. Eupatoria conyzoides maxima Canadensis foliis caulem amplexantibus, Conyza major alata caule foliis Primulæ veris longè amplioribus gravitèr odoratis. Lobel. Trifolium fœtid. apud Fr. Alpin. an hirga quæ alatissimo folio Canadensis glabra Schol. Bolan.

5. Eupatoria Conyzoid. integro Jacobæa folio glabro duriuscula Indiæ Orientalis forte Yasteu Serratulæ affinis Breynij Cat. H. Ac. Lugd. App. hanc mirum cl. Hermanno Alatam Schiragam Hort. Malab. non separat. cum verbis suis Planta inter se admodum diversa ut ex Iconibus nostris liquido patebit. Eruditissimo D.V. Herandi hujus rei fides habetur.

6. Eupatorium Virginian. Salviæ foliis longis, acuminatis perfoliatum. Hujus folia longa, juncta, opposita, ad basin ita continua invicem, ut ea caulis transadigat, sinum quendam, seu cavitatem pro aqua continenda similem efformant.

TAB. LXXXVIII.



Fig. 3.

Fig. 1.



Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 5.

Tab. LXXXVIII.

f. 1. Eupatorium humile Asiaticum Senecionis saniefolijs Lamij P.B.P. Senecio Asiaticus Lamij folio Acad. Reg. Paris. Senecio Americanus Lamij saniefolio ... Boldin. forte Virga aurea humilis Alpina Moris. Prælud. fortetiam Virga aurea folio Veronicæ Mentzelij. Fasic.

2. Eupatorio hirsuta Hyssopi folio rum æmula Virginiana. an Tlalchinol-Xochitl 2. Vmerea Medicina 2a. Hernandez. Hist. Mexic. p. 238. & 415.

3. Eupatoria Valerianoidis floreniveo. Tourn. foliis cum pediculis Americana.

4. Eupatoria Valerianoides. Tristraginis folio. aboriy pediculis. Virginiana. Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem sessilibus. Banister. Cat. MS. an Tlacoxochitl Nov. Hispaniæ Recch. p. 418.

5. Evonymus Canellæ albæ foliis & Madera. palan. D.ni Foderiis Sloane favore ad manum delineandam accepimus.

6. Evonymo affinis Arbor Orientalis ... flore roseo. Styrax Evonymo media affinis. The Sinensium, sive Tsjá Japonensibus flore simplici. Breyn. Prod. 1. Thea frutex Bontyhi quibusdam Kamfurae D. Petiver accepi.

TAB. LXXXIX.



Fig. 3.



Fig. 7.



Fig. 9.

Fig. 2.



Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 6.



Fig. 10.

Fig. 1.

Fig. 4.

Tab. LXXXIX.

1. Pernus Jamaicensis Arbuscula Buxi folijs spinosa flore lutro papilionaceo siliquifera.
2. Filix saxatilis non ramosa minima Ray Cat. Exon. ubi dubium movet an sit Dryopteris Dale Pempy IB.
3. Filix saxatilis communis maxima elegantissima Cat. Hort. Reg. Paris.
4. Filix Alpina Myrrhidis facie Cambrobritannica an Filicula fontana Adianti facie latifolia dentata Schol. Botan.
5. Filicula pumila Lonchitidis Marianthae species Cambrobritannica, an Lonchitis aspera Tabernis Hist. Lugd.
6. Filix parva Cambrobritannica pinnulis latis auriculatis brevibus aculeatis, hastis novissime enumeratas Filicibus ab Inventore D. Lloyd. accepit insignis Botanicus D. Sherard a cujus liberalitate ipse habui.
7. Filix minor Africana Lonchitidis foliapinnulis auriculatis planis. Filix Africana minor Lonchitidis facie P. B. P. in Hort. Regio Hamptoniens. longe celeberrimi scilicet.
8. Filix Virginiana pinnulis oblongis anguste auriculatis tenuissime crenatis longe ab invicem distantibus non spinosa.
9. Filix folia s. Polypodium Jamaicense folijs minus Virginianum.
10. Fagi folijs alterno positis alatis Arbuscula Dionagaria.

TAB. XC.

Tab. XC.

1. Fumaria Virginiana radice fibrosa, foliis tenuissime dissectis, floribus racemosis, siliquis ovatis. an Fumaria semper virens flore ex Hortis Belavis Cat. H. R. Par?
2. Fumaria siliquosa radice quinquefariam tuberosa, labiis conjunctis. Virginiana. Fumaria siliquosa grumosa radice flore gemello monstroso. Banister Cat. Mss. an Fumaria Canadensis radice tuberosa squamulata Acad. Reg. Paris.
3. Fungus congener Betabulum gerens. Fungus minimus pileatus orbiculatus cristatus compositus. D. Lloyd. Rays Synops.
4. Gentiana angustifolia singulari flore purpureo in hibernis siccis. Galega unifolia flore herbaceo. Cat. Hort. Paduv. Georg. a Turre.
5. Gentiana Alcedinis patens, ramosa. Asclepias caule ramoso.

TAB. XCI



TAB. XCII



Tab. XCII.

1. Gram. dactylon Americanum multiplici panicula, spiris aggregatis ex ortu geminis. Raj. Hist. an Tritica junceo foliaspicâ geminâ C. B. P.
2. Gram. arvense alterum panicula strigosa, spiculis magis sparsis. Raj. Cat. exter. an in Historia autem omissum.
3. Gram. Americanum spica echinata ex foliis setosis. Sloan. Cat. Jamaic. Botan. forte Gram. aculeatum Curassavicum P. B. P. seminibus à D. Sherard communicatis, forte D. Dewdy, ex cujus vertice primo evolutum primo observavimus.
4. Gram. Alopecuroides Indicum minus spica Tritica candida laxiori.
5. Gr. Indicum Alopecuroid. holosericeum majus spicâ longa pappescente. an Gram. Alopecuroides Curassavic. spicâ longissimâ Tritici candidâ. P. B. P.
6. Gramen Avenaceum Americanum minus panicula parva.
7. Gr. Miliaceum Americanum, maximum, panicula magna.
8. Gr. Miliaceum Americanum medium panicula magis sparsâ, spinosa.
9. Gram. juncetum latius, panicula spicata, spicatis Americanum.

TAB. XCIII.



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.



Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 7.

TAB. XCIV.



Tab XCIV.

1. Jacea marina Boetica Park. an Jacea purpur. maritim. capitulo spinoso Neapolitana Rajj Cat. Exter.

2. Jacea peregrina Napifolia hirsutis capitulis alata 2 seminibus 3 D. Shea ad. cum ab Exteris in Angliam vehi et secum allatis y ab ipso communicatis in Horti quibusdam Curiosorum apud Nostrates notata est, a nuper vivies suis evulsis in Hort. Acad. Oxon. sub auspiciis D.ni Bobart qui hujus speciem nitide exsiccatum nobis amicissimè transmisit.

3. Jacea fruticans Pini folio C. B. P. Stoebe capitata Rosmarini folio Pona. s. Chamæpitys fruticosa Cretica Belli. I. B. t. 3. Stoebe fruticosa angustifolia Cretica Park. an Chamæpeuce Pr. Alpin. ex ol. 77 Illustrioris hujus Plantæ nobilissimum à Reverendiss. D. Wheeler. adservandæ imperavit.

4. Jasminum vulgò Americ. alterius Euonymo affinis Occidentalis, alatis Rutæ foliis, nucifera cortice adgeniculafungoso. Guaiacum Americ. alterum frustu Euonymi Breyn. Prod. 1. Guaiacum foliis Centaurii Horto Fageliano ejusd. Breyn. Prodr. 2. Packhout Belgarum sub Jasmini titulo. in Hort. Reg. Hamptonens. primùm nobis innotuit. a. fructum occlusum, quatuor obtusis angulis constantem, ostendit.

TAB. XCV.



Tab. XCV.

1. Laurola latifolia floribus albicantibus odoratis Ammiana. sub nomine Jasmini Amaris. Aurantiæ folia recollegimus in Hort. Reg. Hamptonienſ.
2. Imperatoria Ranunculoides Africana minor aphylla. Lasiripij folio alis foliis rigidis margine spinosis. Ranunculus per elegans. D. Francavilla, foliis aculeatis. Lob. Illustrat. 135. Sphondylij 2. Panaces rigidi, hirtoq folio. Planta Africana exactius P. B. P. Nostra etiam foliis aculeatis glabra et lævore splendentia. idéo a sola planta Lasiripho propius accreditata quam Sphondylio. Umbelliferarum. Cap. Bon. Spei. bulbo. in Hort. Reg. Hampton. Observat.
3. Junci Orientalis panicula spicata 2 Madagascariensis. Humanissimi Viri, Mercatoris Londinensis celeberrimi D. Hilleard. favore accepimus.
4. Kalitira scandens procumbens. foliis subrotundis P. B. P. 344.
5. Kaka-Toddali (sorte) Malabarica, ex Oris Coromandel. H. M. par. 2. Frutex bacifer. Indicus spinosus. trifolius floribus spicatis fructu plano rotundo, brassicæ. Ray. Hist.
6. Limonium (sorte) peregrinum folio solidiori structurâ in lasinias bariè desinente. à D. Edw. Morgan. jam olim ex Siccatum accepi.

UMI

TAB. XCVI.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 5.

Tab XCVI.
1. Coriphium erectum segetum minus tectorum nonnullis quorundam dictum a D. Sherard habui
2. Liquiticum nunquam vidi Cam. Matthiolo 1. Apium marinum dulce Scetcum Apium Scelicum vel Apium marinum quibusd. Newtono. Ray Hist. Impe-
rateria affinis Imperatoria Sicula Siebald. Prodr. & Cat. Hort. Edinburg. an Liquiticum quorund. folijs Angelicæ B. l. 3. quod in Alpib.
Laureola vulgo Imperatoria vocatur. Ut huius descripti notat Cesalpinus an Leonotis Apij folijs semine aspero C. B. P. Rosmarinus silvis. Selino simi-
lis, qua Cranolis Isthmia Theophr. Bellon. epist. 1. ad Clus. Crocus sacra bulgo quod benignum induere credatur. vnis fallor (inquit
Bellon.) Solo Cretic. à quibusd. perperam vocatur. Silermarit. Scetium vel Siler montanum falsò Breyn. Prodr. 2.
3. Cinaria latifolia vermiculata C. B. P.
4. Cinaria triphylla major, foliis purpurascentibus, ictu aureo radiari supra caulem, ocreatis. an Cinaria latifolia triphylla major. C. B. P.
Cinaria Cretica latifolia Clus. Hist.
5. Lyto affinis Cerylli folijs Acad. Reg. Paris. Anthyllis Ulmifolia Quorundam.
6. Cynum Italicum Dod. à Stap. in Theophr. Cytisum Buxifolio C. B. P. Cytisum Buxifolijs rotundioribus Syriacum, vel Persicum Breyn. Prod. 2.
Ostrum Persarum Rhamni species Adolph. Vorstij. Cal. Hort. Acad. Lugd.
7. Laurifolia fructu parvo, typhoide non papposo, gemello siliquas æmulante, Arbuscula Maderaspatana.

UMI

TAB. XCVII.



Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.



Fig. 3.

Fig. 9.



Fig. 2.

Fig. 1.

Lycium minus cordato Buxi foli. 1. Madera spatarum. facie Lycium. Imponit filius Buxi C. B. P. Tamarix. Lycium germanum Fragos. an Lycium Arabicum foliis cupressi. Lycium Syriacum. Breyn. Prodr. 2. Lycium Dioscoridis. Hedhad. Rabbinis. Lycium Monbis Libani. Rawolfij. Itinerar.

2. Lycium Madera spatarum. Indici Alpino proximum, frugibus grandioribus aculeis horridum.

3. Lycium Bunagrium. aculeatis minus durioribus, foliis, aculeis ex opposito binis. Herou-Kara Horti Malab. simile simon idem.

4. Lycium pubescens Indicum Orient. Copparis rubrum. foliis vasculis ex adverso gemellis

5. Lycium Balexylon Brigs aculeis in ramulorum faciebus Americanorum. ex hujus ligno sagittas, & frustibus Atramentum conficiunt Indigenæ. Dartwood. Inkberry à Nostratibus nuncupatur. à D. Sherard. specimen ad rem explendum datum est.

6. Lycium majus Americanum Jasmini flore. foliis subrotundis lucidis. Jasminum spinosum American folio lucido subrotundo P. B. P.

7. Lycium Mauritanicum foliis subrotundis Americanum adscens, humoris foliorum argentatis

8. Lycium (forte) non spinosum. rosarum incanis foliis P. B. P. rectius autum. Cerasus Sebastena domestica foliis aliquatenus accedens Prom. Bon. Spei. Capsi Corsi boom bulgo Bregatum.

9. Lychnidi, aut potius Alsines cognata dispermos, s. Chamæjasmes tetrapetaloides inodora, quadrato caule Virginiana.

TAB. XCVIII.



Tab. XCVIII.

1. Lychnidea umbellifera [illegible] pentapetala, fistulosa.
2. Lychnidea Blattaria acaulescens, foliis varia[illegible]
3. Lychnidea Blattaria [illegible]
4. Lysimachia purpurea affinis Americana [illegible]
5. Veronica rectè mihi Breya Prodr. Canariensium planta, supra [illegible]
6. Malus Syriaca spinosa C. B. P. Pin. Kalin [illegible] H. M. part. 4. in Horto R. eg. Hamptoncollegii.
7. Melilotus Indica Orient. minima dispermo, folliculis in summitate aduncis. in Asia hemisphæria, Syriaco Nephel. Nephel. Tembathor, & Malaseæ Breya. Prodr.
8. Muscus polytrichoides pellucidus, foliis denticulatis, ad margines obtuse [illegible] Ray. Synops. Stirp. Britan. append. de Polytrichum aureum medium ejusd. Ray. Histor.
9. Muscus denticulatus minor C. B. P. Park. Muscus terrestris Lusitanicus I. B. [illegible]

TAB. XCIX.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

TAB. XCIX.

1 Barrubium [illegible] spontaneum, spicis densis, semine glabrum Tourn. Inst. R. H. 191. Ballota [illegible] Park. Theat. 1128. Marrubium palustre, flore albo, semine glabro Bob. Hist. 3. p. 387. s. 13. t. 1. f. 1.

2 Melampyrum [illegible] luteum angustifolium Park. Theat. 1128. quod ipse Cl. Raius.

3 Melampyrum [illegible] flore luteo, semine in quatuor semina diviso, foliis sparsim ad latera [illegible] Inst. R. H. 191. Pedicularis [illegible] flore luteo, galeâ non multo colori luteo dimidio majore, labro inferiori trifido, crenato, ciliato, [illegible] Bauh. Pin. 151. Rhinanthus [illegible] flore luteo dupici serie ordinatum, [illegible] striatis, ore compresso, labio superiori in acutum dentem longiorem, utrinque brevibus dentibus instructo, inferiori in tres [illegible] Cat. Hort. Cantab. 204. Rhinanthus, vel Crista Galli

TAB. C.



Fig. 1.

Fig. 6.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 3.

Fig. 5.

TAB. CI.



1 Musci pulvinum [illegible] synops. [illegible] floridum pronum magnum, capitula quidem [illegible] praecellentissima, [illegible] [illegible] [illegible]

TAB. C II.

Tab. C II.

1. 2 Onobrychis Madritensium diphyllos siliculis aspertis huius nyttia humanissimè aquè ac Clariss. Viris D^ns Fredericis Sherardo et Dillenio communicatus.
2 Onobrychis 3 Hedysarum Cupreum Alpin. perennis siliquâ glabrâ flore albo Seb. Mus. Onobrych. Cupreo lanuginosa B. Pin. Prod. 99. Tabula habemus.
3. Ornithogalo affinis Virginian. flore purpureo pentapetalo Banist. Cat. Mss. Flore viribulbillis, ut in Allio carnino constat. Trifolium acetosum minus, radice parva rotunda Lilii more imbricata Banist. Cat. Mss. a capitulum bulbillis ejus enatum in digitat.
4. Daxis purpurea Virginiana radice Lilii more imbricata Banist. Cat. Mss. a capitulum bulbillis ejus enatum in digitat.
5. Pratularia 5 Cristagalli affinis Virginiana Aizoo multifido folio capitibus rotundis flor. purpureis pallidis et Apium congestis. Euphrasia Virginiana cornis coccineis flore albido theca foliacea incluso Banister. Cat. Mss.
6. Phaseoli tuberosi Cap. Bon. Spei sub Batatas Lagonis trifoliatæ tilulo asseruimus.
7. Potemogeiton simili Graminifolia ramosa, v ad geniculo polystrato. Potemogeito affinis Graminifolia aquatica Ray. Histor. Plantar.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Tab. CIII.
f. 1. Palma Hygri Park. Theatr. Palma facie Hairi I.B.1. 1. Palma Americ. spinosa C.B.P. Palma Brasiliens. vi. 1. Ayri Pison. p. 129. Palmiste ginnau Rochefort. p. 60. forte Macou Arbor Barbadensium Ligeni, hujus Arboris lignum marmori nigro simile ferri modo in aqua fundum petit, ex inde Ebeni instar ejus quidam autumant, plurimas holces ex Insula Jamaicensi allatas in Horto Comptoniano aliquando conspeximus.
2. Palma Americana foliis Polygonati brevioribus, leviter serratis, & nonnihil spinosis, truncо crasso Breyn. Prodr. Palma Americana non spinosa, crassis rigidisq; foliis caudicis scabro in cæspitem prolubrante P.B.P. in Horto Reg. Hampton-Iudicum, & collegimus.
3. Periclymenoides audens Arbuscula Virginiana siliquosa.
4. Pimpinella Sanguisorbæ petris minima, radice magna. hujus folia Pimpinellæ foliis haud majora, à Cl. D.r Tournefortio in Hispan. collecta fuit, & à D. Sherard amicissimè nobis communicata est.
5. Plantago Coronopus dicta maritima, brevi, lata, & dentato folio pilosa. Coronopus Massiliensis hirsutior latifolius Sch. Bot. Coronopus foliis acutis in margine dentatis Ray Hist. Pl. Plantaginis affinis Bipindella, Siculis herbula I.B.1.3. Coronopus maritimus Prodromus folio sulcato longo. 258. non quidem est Coronopus maritima nostras, nec multum similis ut Rerum omnium Naturalium, Vir peritissimus, & Botanices Sanctius dimus Arbiter & Præsidium singulare, D. Joh. Rajus recte pronunciat. Cat. Exprès. quamvis Casp. Bauhino, tandem fanat. Plantago Apula bulbosa Park.
Plantago Apula laciniato bulbosa Fab. Columna. Plantago pilosa bulbosa C.B.P. huic nostræ persimilis esse videtur.
6. Polygonum Germanicum caule foliato, floribus in summitate in Polygonum angustifolium quasi fasciculatum terminatum Sch. Bot. f. 2. Polygono angustissimo folio affinis C.B.P. Hæmorrhoidalis quæ ad Caryophyllearum sylvestrium classem referi debet Clar. reputavi. Hist. app. altera. ad lib. 6. sectionem Polygonum Soldanicum tertium I.B.1.3.

TAB. CIV.



Tab. CIV. 1. Passiflora Vesicaria hederacea folijs lanuginoso-cordatis serratis flavum ex albo purpureo variegatis. Hedera Muralis asperior Denis avia lanuginosa cordis gravis Marcgr. 73. Flos Passionis Cur. asperior. Hedera hirsuta folio, flore purpureo variegato P. B. P.
2. Periclymenum herbarum recturn Virginianum D.r Tinkar sive dubi bulgo botanum hujus generis esse videtur illo Periclymenis spinis stantibus foliis ovatis Arborum radices emittens Mss. Cannii Hort. Malab. dicta pag. 7.
3. Phaseolo affinis Arbor Indica tortuosa dicta polyphyllos, non spinosa foliis rotundis subhirsutis.
4. Piperi longo similis Pistolochiæ folijs obcordatis Madera apud Laborandi. 4. Piso his multum convenire videtur Hist. Brasil. pag.



Tab. CV.

F. 1 Phaseolus unifolius. Cirratilis Asiaticus, e folio dispermus. Crotalus Americanus Asari folio singulari. P. B. P. in Hort. Regio Hampton. multitum observavimus.

2. Phaseolus unifolius. Cirratilis trimino folio sinuato monospermus, an Phaseolus multimus perennis Americanus floribus luteo Meliloti, foliis Asari annuus, rigidiorque Breyn. Prodr. 2.

3. Phyllitis parva Sazatilis Virginiana pro summitatis foliorum radicosa Raii Hist. Cat. Stirp. Virg. Herba de pira, hujus folium Phyllitidis ramosæ Alpinæ folium parvitate figura simulatur et huic forsan ista proxime accedit, alterius ramificationis defectum alterius per admirabilem Propagandi medium ibi fere peculiarem, supplentibus benefica Natura.

4. Portulaca Curassavica sanguinea Kali folio Breyn. & alter flore rubente P. B. P. Portulaca Americ. erecta sanguinea foliis Psyllij, floribus in caulium summo rubro pabulata magnis, Breyn. Prodr. 2.

5. Portulaca sanguinea prostrata Vermiculata foliis Americana. Portulaca Americana procumbens Sedi tenuifolij foliis, & facie floribus in ramorum summo pulchre purpurascente Br. Prodr. 2. Beldroega forte Lusitanis s. Caaponga Brasiliana? Piso. p. 44.

6. Portulaca affinis Americana tricapsularis erecta flore albo, pediculis angulosis. Portulac. Americ. g. Curassavic. latifol. erect. flor. albo P. B. P. & hujus caprusculi tripartito diversa semina per maturitatem impatulissima. hastes novissime enumeratas plantas in horto Reg. Hampton. titulis nostris summa Voluptate hisce brevibus olim collegimus.

TAB. CVI.



Tab CVI.

1. Phmuo-Scorpuroides. Heliotropium Plantaginis species. Polygonati angustifolij. Madera spal. huc fortè perkind. Asphodelus Bo. Phmicibus. Matthiol. lib 2. p. 64.
2. Ejusd. summitas floribus ornata, quæ decussim vasis Scorpioidis caudas pulchrè repræsentat, ut in Heliotropio sauvos Cla. D. Fredovius, Stirp. habuimus
3. Ranunculus Nemorum Fragariæ folijs Virginianus. Banister. Cat. Mss.
4. Ranunculus Nemorosus Aconiti folijs Virginianus, Napelli radice. Ranunculus Thalictri folijs arumoidis radicibus Banister. Cat. Stirp. Virg. nuper edit.
5. Ranunculo affinis Umbellifer, foliis accedens Chelidonij minoris folio. Ruta Sylvatica minor. Asarina minor. Ruta Sylvatica P. B. P.
6. Ranunculo affinis Umbelliferis accedens Chelidonij minoris folio. Ruta Sylvatica major. Asarina major. Ruta Sylvatica P. B. P.
7. Pentaphyllum Alpinum minus, foliis tenuioribus, altius serratis. caule tenello purpurascente. an Pentaphyll. Fragiferum minus, aureo flore Clus. Hist. cui folia magis diligenter attributa. nostra equidem nobis hirsuta apparent. hujus exemplar amicissimus Vir e apud Londinenses Pharmacopœus primus D. Philippus Schmick sauchs nobis contulit.



Tab. CVII.

1. Pyrola affinis Virginiana repens fruticosa foliis rigidis scabrihirtis asperatis. flore pentapetaloide fistuloso. Pyrola repens foliis scabris, flore pentapetaloide fistuloso. Banister.
2. Reseda Linariæ folio hyemali glauco folio Sch. Bot. in Reseda Linariæ folio C. B. P. item Reseda alba minor ejusd. C. B. P.
3. Rhamnus Maderaspatanus Evonymi pallentibus foliis spinis brevibus duplicatis.
4. Rhois similis Syagro dicto foliis tenuissime incisis spinosa rachi medio appendiculatis caule arboreo. An Coriaria Arbor spinosa Acaciæ foliis sane P. B. P. in tit. Addend. forte. Quauhtecpalli Pitzalmas. Copalli sive alo tiphylla alia Hernand. p. 49. Fingrago. Sabina arbor (i. e.) Savin Tree Barbadensibus nostratibus dicta.
5. Ricinus parvus urens. foliis Querneis Virginianus Banistr. Cat. Shirl. Virg. an Quernis foliis Arbuscula spinosa lanescens Portoricensis. P. B. P.
6. Rumi fructu parvo, frutticosa Curassavica folio Phyllis. P. B. P.

TAB. CVIII



Tab. CVIII.
1 Rhamnus Maderaspatanus Hyperici frute[x]ntis folio spinis brevissimis durissimis horridus.
2 Rhamnus arcostaphylos Canum Fingrego Cainoxmiscipi dictum sortiskatu Karu-Walli H.M spinarum altissimus pethe huius parum congruit.
3 Rhamnus Mauritanicus spinosissimus curinduplicatis durioribus foliis in margine spinosis humanulatis flavoris Br.ti Fred. Sladre Obtinuimus.
4 Rubus folijs quinatis digitatis D. Plucon. in Hort. Reg. Paris foliegit D. Sherard et nobis communicavit.
5 Sanicula Alpina angustifolia flore carneo Sedum Alpin. alterum Franciscus Gregory Regiensis Lappusium. Fab. Columna. ecphr. p. 2. Sedum Alpinum angustifolio folio flore carneo C.B.P.
6 Sanicula alpina angustissimis brevioribus foliolis per intervalla consertis. Sedum Alpin. primum Column. ecphr. p. 2. Sedum Alp. exiguis foliis C.B.P. an Sedum Alpinum minimum carneo flore Sch. Bol.
7 Scabiosa capitulo Chrysanthemi Mysoni foliis alato caule Maderaspatana.

TAB. CIX.

Fig. 4.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

Tab. CIX.

1. Scabiosa Campanoid Americana capitulis floribus albidis parvis P. B. P.
2. Schoth. album. s. Jasminum Indicum Lauri fol. medium umbellatum floribus albicantibus P. B. P. Bam. Schoth. Hort. Malab. P. 2.
3. Serratula Noveboracensis maxima foliis Dentis leviter serratis P. B. P. inter Addend. Serratula Virginian. min. angustif. mollis Boerya. Prod. 2. forte Atractylis apud Gazic. Ynis. Rederlyo. Nov. Hisp. P. 256. huc congener at Malab. - quid Nov. Hisp. ejusd. pag. 423.
4. Sesamum alterum foliis trifidis Orientale seminebscuro. in Cor. Elu Hort. Mal. P. 9. Bidtjam Hitem. s. Bidtjam nigrum Malaccensibus Sesamum Indicum foliis amplo serratis, flore majore, semine nigricante Comelin. Annot. in Hort. Malab.



Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

7. [illegible] H. R. [illegible] Lobel Ic. Ad Bonum retundo ser. [illegible]

4. Smilax [illegible] Lugd. append. 10

5. Smilax Virginiana [illegible] Hernand. 218. Pseudo China radix ex Virginia China Mexicana Hernand. 218. Pseudo China radix ex Virginia Nov Hisp An. Reich 398. Jeapanga Brasilensibus, Pison 258. an Kari Vitandi H. Pet. Burkhout Belgæ Orientali, ubi commendatur apud nostrates Virginiam habitantes, ex hujus Stipite parantur Suppositoria ut nobis affirmant Amphitryon, Virtutum Virginiæ apprime honorandus Dn. D. Byrd Ufragius, [illegible] fructuum augendorum artemque alia quamplurima [illegible] copiose profert.

6. Smilax aspera Brasiliana grandiori folio, [illegible] Zarza 249. Hernand. 290. sortem am Smilax aspera Zarsynthi Alpina I. B. I. 2.

TAB. CXI.



Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.

Tab. CXI.

1 Similax [illegible] Nicandri. Lonicero similis, [illegible] Mexicana. Nicandri 5. Cerasi-gerula Fr. Hernand. 82 in Hist. in fructibus D. Frezier memorat.

2 Similax Cortex Indiana Stipite quadrangulari, [illegible] ad basim conjuncti, ab illustri Comite de Tessin Cortex accepimus.

3 Solanum Americanum Strychnodendri [illegible] antheris virentibus quatuor. in Solan. fructu c. Brasilian. sive Capsico, baccis rubris P. B. P.

4 Solan. Curassavicum arvense Solano Antiquorum similis, [illegible] origam habentes P. B. P. inter Sesuvia Indica. Sesuvium Surinamense lanuginosum polycarpon Br. Prod. 2

5 Solanum triphyllum flore tripetalo atro-purpureo, [illegible] Sesselis. Banist. Catal. Virgin. Hujus autem flores nobis videntur sex foeduli, sive petalis constare quorum tria subjecta tabi bridia sunt, brevia, tria vero superiora longiora, atro-purpurea sunt, quemadmodum in Solano triphyllo Canadensi cornuto, cui haerent quam proxime cognata.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Tab. CXII.

1. Senecio Americanus, altissimus, Blattariæ del Hurgay folio Sch. Bolan. Senecio Americ. maxim. Dipsaci s. Virgæ Pastoris folio P. B. P. an Senecio Cichorii folio Virginianus flore sulphureo, odore Pastinacæ Cat. Mss. H. Oxon.

2. Solan. Barbadense ex dermosum minus hirsutorum, Circææ foliis mollib, & incanis, sive Heliotropium Curassavicum Stæchadis foliis mollib, subhirsutis P. B. P. Heliotropium Americanum majus, foliis Populi nigræ lanuginosis, flore albo minimo. Breyn. Prodr. 2.

3. Spongia flaviabilis, infractuosa, per fragilis, ramosissima, rostras, in Insulis fluvio prope Oxonium inventa. D. Sherard & nobis munere donavit.

4. Spongia marina fistulosa, maxima, muricata, an Spongia ramosa fistulosa. C. B. P. dedit nobis D. Doody.

5. Syringa Volubilis Virginiana Myrti majoris folio, alabastri semine, flore, odorato, hedera Helix minus, s. Jasminum luteum odoratum Ray Hist. Gallo-Prov. in s. Jasmin. Virginian. scandens & semper virens Park. Theatr. Pseudo-Apocynum Myrti-folium Virginianum. Banist. Cat. Slirp. Virg.

6. Tithymalus Curassavicus, Salicis & Atriplicis foliis variis, caulib, biradentib, P. B. P. Tithymalus Indicus, Salicis & Atriplicis foliis Breyn. Prodr. 2.

TAB. CXIII.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 2.



Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 4.

Tab. CXIII.

1. Tithymal: æ otic, Carobr folijs aliqualenus accedens. an Tithymalus Sisulus polysoccos Portulacæfolio Boec. 39. Tithym. baccifer Hyacinth. Ambr. 22. Phytolog. 532.
2. Tithym. Indic. annuus dulcis. floribus albis. caulibus binis dentibus P. B. P.
3. Thymelæa Africana Linariæfolio. floribꝰ albis in extremo caulium odoratissimis. Thymel. Linifoliæ similis African. floribꝰ pallidis odoratissimis P. B. P.
4. Trifolium stellatum glabrum Ger. emac. Trifol. capitulis Dipsaci quorundam Rāy. Synops.
5. Trifol. supinum cum glomerulis ad caulium nodos et bicalatis floribꝰ purpurantibꝰ Rāy. Histor. an Trifol. parvum rectum flore glomerato cum unguiculis IB. t. 2. meritò autem quærat (inquit rudiss. noster Rajus) cur rectum dicat, cum in Descriptione caulem supinum attribuat.
6. Trifolium cochleatum modiolis spinosis Rāy. Synops. Shrp. Britan.
7. Valeriana Cretica Curassavica semine aspero bicorne P. B. P. in Hort. Reg. Hamptoniens legimus.
8. Trifolium siliquosum Leto affine Madraspatan. siliquis longis, ex adverso binis propendentibus.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 2.

Tab. CXIV.

1. Herbasco congener. Madre espatin. multi ex aliis foliis ovatis sæpe lanuginosis. flore parvo purpureo.
2. Veronica adscendens radice tenuifolia floribus cæruleis pallidis barbatis summo caulium fere umbellatis. a. vv. populum seminalem per Microscopium visam exhibet. Madre espatin ad Ornatissimum hortum D. Hilcard allatæ sit. qui nobis humanissime communicavit.
3. Veronica tex atilis pars e caulibus nudis RAY. Obs. pag. 442. munere D. Sherard accepimus.
4. Viburnum Americanum non spinosum Malifolio floribus ex cæruleo P. B. P. Camara flore rubro Mazer. p. 5. fortè idem Camara flore albo ex ripa Fluvij S. Francisci. ejusd. an Camarad uba Rich. Tbamquirh s. Maximum horridum. & calidum Hernandez. alg. nostrinum flores primum lutei. deinde rubri. tandem nunquam. multitudine tanquam coccineus videtur. vide Hort. Reg. Hamptonian. cum floribus & fructu conspersimus.
5. Viburn. Americ. ederæ rotundifolio parvo orbiculato. floribus y baccis foliolis inter ipsa. P. B. P. 384.
6. Pisa Lathyroides s. Cathyrus Dioscoridis. Vexillo rubro. labello. petalis rotundis amplexibus carulis. Morin. Hist. 2. Cathyrus. 5. Cicercula Mosenensis RAY. Hist.
7. Viola Virginiana tricolor foliis multifidis. caule aphyllo. Banist. Cat. Virgin. an Viola Alpina folio in plures partes dissecta. C. B. P. Viola montana lacinulato folio Clus. Hist. Viola montana folio multifido I. B. Hist.
8. Virga aurea flore albo spicato Brevn. Prod. 2. Virga aurea Novebor. arenosis floribus albis. folio Bellidis ramosa Canadensis Cornuti. P. B. P.

TAB. CXV.



Tab. CXV.

1. Alni folia Americana serrata flor. pentapetalis albis in spicam dispositis.
2. Ejusdem Spica florum, cum in majorem prospectum dimensi.
3. Apocynum Virginianum Asclepiadis folio, erectum, floribus pallidè cæruleis, radice crassâ. forte Mayothicyamoli Nov. Hisp. an. Ant. Raich. 388.
4. Chrysanthemum ex Insulis Caribæis leucoïs incanis, & sericeis foliis argenteis crassis.
5. Evonymus Virginianus, Pyracanthæ foliis, semper virens, capsulâ bicorni verrucarium instar asperatâ rubente.
6. Frutículus Americanus, cordatis foliis pentapetaloides, radice lignosâ.
7. Nymphææ congener Aconito dophyllon dicta caudens polyphylla. s. Dracontij similis herba Americana pusilla.

TAB. CXVI.

Tab. CXVI.

1. Hieracium magnum Hispanicum Park. Doris Leonis latifolius caulescens C. B. P. in Prodr. Hieracium Pyrenaicum Blattariæ foliis minus hirsutum, Scab. Bot. ubi pro nondum descripto ponitur.
2. Solo affinis hirsutie flore subluteo. C. B. P. Anthyllis leguminosa asperpurascente flore Clus. Hist. Cetæ affinis hirsuta herba flore suave rubente. Moris. Hist. 2.
3. Methonica Malabarorum, Pongchala Zeylanensium Mus. Zeyl. Cal. H. Ac. Lugd. à P. P. Mondoni Hort. Malab. Cidium Zeylanicum, Superbum dulcè.
4. Thymus capitatus e Cilicia a Soldi missus conferus, an Thymus capitulis maioribus Massiliensibus Cal. H. R. P. a D. Wheeler habitus?
5. Thymum majus longifolium Stœchadis foliacea capite purpureo ascente pilosum. forte Thymbra capillacea folia hirsuta magno capite purpurascente. D. Tournef. idem quod apud Colletianos Romanos quas Cl. Tournefortius ad D. Sherard & Lusitanias animus sub hoc titulo aliquando conspexerunt.
6. Virga aurea Americana Tenuifolia, semine sapore, pediculo aperte sesamoide, forte Tlalchichino a Petiveri Mexicensib. 5. Herbarium 3.° Hernandi, in Oloxochuitl quod Hernandi Hist. Mexic. de hujus stirpis genere determinare non audeo.
7. Fanguis Virginianus ex Stirpe equino capillaceus annuus, capitulo viridi nigro punctulo in summitate notato. Banister. Cat. Stirp. Virg. MSS.

TAB. CXVII.



Tab. CXVII.

1. Ericoides s. Mesembrianthemum Africanum frutescens floribus albis parvis umbellatis. ou Mesembrianthemum Afric. frutescens minus triangularibus foliis viridib., cornuum taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato parvo, pentagono, lignescente Breyn. Prodr 2.
2. Rossolis Lusitanius maximus foliis Asphodeli minoris D.r Tournefort. Charles lemoldes Gribij in Epist Bachol. ad Viridar. Lugd. munere D. Courtene accepimus.
3. Serpentaria reptans flor. b. Staminei spicati. Bryoniæ nigræ folio ampliore pingui, Virginiensis. huc etiam pertinet Mexazobul. Mexicanis, Hernand. 444. sortè etiam Xaxahoatli Nov. Hisp. Reich. 438.
4. Lysimachia spicata floculorum, cum adjustam explicationem assurgant.
5. Tulipifera Virginiana tripartito Aceris folio, medijs lacinijs bilobatis abscissis. Ray. Hist. Tulipifera arbor Virginiana Cat. H. Ac. Lugd. Populus, aut potius Alnus Tulipifera conus erectus. Banist. Cat. Slurp. Virginiens.
6. Vitis arborum flore albo speciosa Americanum folijs formâ siliquarum Nerij. Nerijnique effigie. Kays Bakel B. Hist. Frutus Nerij siliquæ figurâ C.B.P. pro arbor.

TAB. C XVIII.



Tab. CXVIII.

1. Alsine, Spergulæ facie Maderaspatana. foliis laterib⁹ seminerui minutissimo nigro. an Tremopili Hernandi Nov. Hisp. Raculij.
2. Amaranthus spica longâ candidissimâ. Spicæ foliis Maderaspatana.
3. Antirrhino affinis, pusilla planta, foliis scabris: Maderaspatana.
4. Cardiaca s. Leonuros Hyssopi hirsutis foliis Maderasp. floribus dilute rubris, unico tantùm barbillo in armulorum cymis.
5. Chrysanthemum Maderaspatanum, Menthæ arrens. folio & facie floribus bigemellis ad foliorum alas, pediculis curtis.
6. Tithymalus botryoides, cordatis foliis, Indiæ Orientalis.

TAB. CXIX.

Tab. CXIX.

1. Gramen miliaceum, brevi folium, rubro spica purpureo-sericea Madraspatanum.
2. Gram. dactylon Madraspatanum, eadem pluribus spicarum paribus ad summum caulis, solidi in bipartitas pontis. folia magna sui parte, culmum seu vaginâ complectuntur, reliquam surrigunt brevi ovum rigidam margine trispatam.
3. Gram. Cyperoid Madraspatanum, Auricula Genero capitulis sparsis.
4. Lysimachia affinis Saturejæ folio Madraspatana, capsulis in summitate foliorum bellatis.
5. Melampyro cognata Madraspatana spinis horrida, an Colsita-Vrella? Hort. Malab. P. 9. Eryngium Zeylanicum, febrifugum floribus lutei Herbar. Vivi. Herm. Cingalensibus Kathu Karobiti, fortissimam hac pertinet Bald. Schulii Hort. Malab. p. 2. Genista spinosa spicata folii. Commel. in Hort.
6. Phaseolus arborescens intanus, monospermos, siliquis, lenti formibus, Madraspatanus.
7. Sinapi trum Indicum diphyllon, siliquis ad alas exiguo pediculo binis. Cupa-Vrela forte Hort. Malab. P. 9.

TAB. CXX.



Tab.
1. Mimosa pumila Madraspatana. pinnis terreastrinis, ad foliorum exortus innocuis spinulis obarmata.
2. Polygonum Solinoides Madraspatanum. Thymi citrullati foliis inseanum.
3. Portulacæ affinis Polygonoides. Blitifolio rosacea Madraspatensis.
4. Rhamnus cordatis foliis subtus cæsijs Madraspatan.
5. Ricinus Althææ folio mollius incanus Madraspatanus.
6. Ricinus urens Cannabinis foliis triphyllus; è Madraspatan. an Urtica Indica pentaphyllos a Cæsio Mich. Nuty. catal.
7. Trifolium Madraspatan. caulibus plus minus scandens, Papilionaceo flore omodo trilobatum. an Com.s Comitis Mexicensis, Hernand. 252. Apios Americana triphylla siliquis Orobi.
8. Viola surrecta Madraspatensis Cerri facie, rotundioribus imis foliis.